

LISTA DE LAS AVES DE MADRID

En esta lista se presentan todas aquellas especies citadas en la Comunidad Autónoma de Madrid hasta el 31 de diciembre de 1996. Se incluyen el nombre en castellano, nombre científico, estatus en Madrid, estatus en España y estados de conservación según el catálogo regional de especies amenazadas, el Libro Rojo, BirdLife y UICN.

El estatus de las aves es, en la mayoría de los casos, una aproximación y una simplificación de la realidad, ya que existe una considerable falta de información acerca de la mayor parte de las especies. Esperamos que el presente anuario sirva para ir perfeccionando poco a poco la presente lista.

Los símbolos considerados para el estatus son los siguientes:

Madrid (elaboración propia):

- A Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid
- r Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid
- E Estival. Habitual en primavera y verano, con cifras importantes
- e Estival. Habitual en primavera y verano, con cifras reducidas
- I Invernante. Habitual en otoño e invierno en cifras importantes
- i Invernante. Habitual en otoño e invierno en cifras reducidas
- P Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño), con cifras importantes
- p Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño), con cifras reducidas
- S Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes
- s Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas
- ? Las observaciones que se refieren a la especie seguramente tengan su origen en aves escapadas de cautividad

España (CODA-SEO 1985):

- A Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en España, pero hay más de cinco citas para la especie homologadas por el Comité Ibérico de Rarezas
- R Accidental. Se presenta muy raramente en España, menos de cinco citas homologadas por el Comité Ibérico de Rarezas.
- E Estival. Habitual en primavera y verano
- I Invernante. Habitual en otoño e invierno en cifras importantes
- i Invernante. Habitual en otoño e invierno en cifras reducidas
- ? Las observaciones que se refieren a la especie seguramente tengan su origen en

aves escapadas de cautividad

- M Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño), con cifras importantes
- m Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño), con cifras reducidas
- S Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes
- s Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas
- D Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año pero al menos una parte de la población realiza desplazamientos dispersivos de tipo y amplitud variable

Los símbolos considerados para cada estado de conservación son los siguientes:

Catálogo Regional de Especies Amenazadas (BOCM 1992):

- E En peligro de extinción
- S Sensibles a la alteración de su hábitat
- V Vulnerables
- I De interés especial

Libro Rojo (Blanco y González 1992):

- Ex Extinto. Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 años
- Ex? ¿Extinto?. Taxón para el que no se cumple el requisito de 50 años de la categoría anterior, pero del que se tiene constancia de que está de hecho extinguido



- E En peligro. Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los factores causales continúan actuando
- V Vulnerable. Taxón que entraría en la categoría "En peligro" en un futuro próximo si los factores causales continuaran actuando
- R Raro. Taxón con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las categorías anteriores, corren riesgo. Normalmente estos taxones se localizan en áreas geográficas o hábitats restringidos, o bien presentan una distribución rala en un área más extensa
- I Indeterminado. Taxón que se sabe pertenece a una de las categorías anteriores, pero del que no existe información suficiente para decidir cuál es la apropiada
- K Insuficientemente conocido. Taxón que se sospecha pertenece a alguna de las categorías precedentes, aunque no se tiene certeza debido a la falta de información
- O Fuera de peligro. Taxón incluido anteriormente en alguna de las categorías precedentes, pero que ahora se considera relativamente seguro porque se han tomado medidas efectivas de conservación o se han eliminado los factores que le amenazaban
- NA No Amenazado. Taxón que no presenta amenazas evidentes

BirdLife (Tucker y Heath 1994):

- SPEC 1 Especies presentes en Europa que son motivo de preocupación a nivel mundial, porque están consideradas como Globalmente Amenazadas, Dependientes de Conservación o Sin Suficientes Datos
- SPEC 2 Especies que están presentes principalmente en Europa y que tienen un Estado de Conservación Desfavorable en Europa
- SPEC 3 Especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa pero tienen un Estado de Conservación Desfavorable en Europa
- SPEC 4 Especies que están presentes principalmente en Europa pero tienen un Estado de Conservación Favorable en Europa

UICN (Blanco y González 1992):

- E En peligro
- V Vulnerable
- R Rara
- D En declive
- L Localizada
- S Estable

BIBLIOGRAFÍA

Para la realización de la lista se ha empleado la siguiente bibliografía:

- ✍ Blanco, J.C. y González, J.L. 1992. *Libro rojo de los vertebrados de España*. ICONA. Madrid.
- ✍ B.O.C.M. 1992. DECRETO 18/92, del 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres y se crea la categoría de árboles singulares. *BOCM*, 85: 5-11.
- ✍ CODA-SEO. 1985. *Situación de la avifauna en la Península Ibérica, Baleares y Macaronesia*. Madrid.
- ✍ Díaz, M.; Asensio, B. y Tellería, J.L. 1996. *Aves Ibéricas I. No passeriformes*. J.M. Reyero Editor.
- ✍ SEO/BirdLife. 1994. *Atlas de las Aves Nidificantes en Madrid*.
- ✍ Tucker, G. M. y Heath, M. 1994. *Birds in Europe. Their Conservation Status*. Birdlife International. Cambridge.
- ✍ *Ardeola*: Noticiarios ornitológicos, informes del Comité Ibérico de Rarezas (Actual Comité de Rarezas de SEO/BirdLife) y antiguas secciones de Notas Breves.



Castellano	Nombre	Científico	Estatus		Conservación			
			Madrid	España	Madrid	Libro Rojo	BirdLife	UICN
Zampullín Común		<i>Tachybaptus ruficollis</i>	S-I	S-D		NA		S
Somormujo Lavanco		<i>Podiceps cristatus</i>	S-I	S-D/i		NA		S
Somormujo Cuellirrojo		<i>Podiceps grisegena</i>	A	i		NA		S
Zampullín Cuellinegro		<i>Podiceps nigricollis</i>	s-i-r	S-D/i	I	R		S
Cormorán Grande		<i>Phalacrocorax carbo</i>	I	I				S
Avetoro Común		<i>Botaurus stellaris</i>	A	s		E	SPEC 3	(V)
Avetorillo Común		<i>Ixobrychus minutus</i>	e	E/m	S	I	SPEC 3	(V)
Martinete Común		<i>Nycticorax nycticorax</i>	E-i	E/m/i	S	R	SPEC 3	D
Garcilla Cangrejera		<i>Ardeola ralloides</i>	A	E/m		E	SPEC 3	V
Garcilla Bueyera		<i>Bubulcus ibis</i>	S	E/D		NA		S
Garceta Común		<i>Egretta garzetta</i>	s	S-D/m	I	NA		S
Garceta Grande		<i>Egretta alba</i>	A	i		NA		S
Garza Real		<i>Ardea cinerea</i>	I	E-D/i		NA		S
Garza Imperial		<i>Ardea purpurea</i>	e-p	E/m	S	V	SPEC 3	V
Cigüeña Negra		<i>Ciconia nigra</i>	e-p	E/m	E	E	SPEC 3	R
Cigüeña Blanca		<i>Ciconia ciconia</i>	S-E	E/I/m	V	V	SPEC 2	V
Morito Común		<i>Plegadis falcinellus</i>	A	s		E	SPEC 3	D
Espátula Común		<i>Platalea leucorodia</i>	A	E/m		V	SPEC 2	E
Flamenco Común		<i>Phoenicopterus ruber</i>	A	S-D/m-i		R	SPEC 3	L
Cisne Negro		<i>Cygnus atratus</i>	A?					
Ansar Campestre		<i>Anser fabalis</i>	A	i		E		S
Ansar Común		<i>Anser anser</i>	i-P	I		NA		S
Barnacla Cariblanca		<i>Branta leucopsis</i>	A?	i		NA	SPEC 4/2	L
Ganso del Nilo		<i>Alopochen aegypticus</i>	A?	R?				
Tarro Canelo		<i>Tadorna ferruginea</i>	A?	A?		E	SPEC 3	V
Tarro Blanco		<i>Tadorna tadorna</i>	i	S-D/i		R		S
Silbón Europeo		<i>Anas penelope</i>	i	m-I		NA		S
Anade Friso		<i>Anas strepera</i>	s-i	S-D/I	I	NA	SPEC 3	V
Cerceta Común		<i>Anas crecca</i>	i	I		NA		S
Anade Azulón		<i>Anas platyrhynchos</i>	S-I	S-D/I		NA		S
Anade Rabudo		<i>Anas acuta</i>	i	I		NA	SPEC 3	V
Cerceta Carretona		<i>Anas querquedula</i>	p	M		R	SPEC 3	V
Cuchara Común		<i>Anas clypeata</i>	s-I	I		NA		S
Pato Colorado		<i>Netta rufina</i>	s	S-D/i	I	R	SPEC 3	D
Porrón Europeo		<i>Aythya ferina</i>	s-I	S-D/I		NA	SPEC 4	S
Porrón Pardo		<i>Aythya nyroca</i>	i	s-D/i		E	SPEC 1	V
Porrón Moñudo		<i>Aythya fuligula</i>	i	I		NA		S
Porrón Bastardo		<i>Aythya marila</i>	A	i		NA	SPEC3	L
Porrón Osculado		<i>Bucephala clangula</i>	A	i		NA		S
Serreta Mediana		<i>Mergus serrator</i>	A	I		NA		S
Malvasía Canela		<i>Oxyura jamaicensis</i>	A?	R				
Malvasía Cabeciblanca		<i>Oxyura leucocephala</i>	A	S-D		E	SPEC 1	E
Abejero Europeo		<i>Pernis apivorus</i>	e-p	E/M	I	NA	SPEC 4	S
Elanio Común		<i>Elanus caeruleus</i>	A	S-D	I	R	SPEC 3	V
Milano Negro		<i>Milvus migrans</i>	E-P	E/M		NA	SPEC 3	V

Milano Real	<i>Milvus milvus</i>	s-i	S-D/i	V	K	SPEC 4	S
Quebrantahuesos	<i>Gypaetus barbatus</i>	A	S-D		E	SPEC 3	E
Alimoche Común	<i>Neophron percnopterus</i>	p	E	E	V	SPEC 3	E
Buitre Leonado	<i>Gyps fulvus</i>	S	S-D	I	O	SPEC 3	R
Buitre Negro	<i>Aegypius monachus</i>	S	S-D	E	V	SPEC 3	V
Culebrera Europea	<i>Circus gallicus</i>	e-p	E	I	I	SPEC 3	R
Aguilucho Lagunero Occid.	<i>Circus aeruginosus</i>	s-i	S-D/m-i	S	V		S
Aguilucho Pálido	<i>Circus cyaneus</i>	s-i	E/m	I	K	SPEC 3	V
Aguilucho Cenizo	<i>Circus pygargus</i>	E	E	V	V	SPEC 4	S
Azor Común	<i>Accipiter gentilis</i>	S-l	S-D		K		S
Gavilán Común	<i>Accipiter nisus</i>	S-l	S-D/m-i		K		S
Busardo Ratoneo	<i>Buteo buteo</i>	S-l	S-D/l		NA		S
Aguila Imperial Ibérica	<i>Aquila adalberti</i>	s	S-D	E	E	SPEC 1	E
Aguila Real	<i>Aquila chrysaetos</i>	s	S-D	S	R	SPEC 3	R
Aguililla Calzada	<i>Hieraetus pennatus</i>	E	E/m	I	NA	SPEC 3	R
Aguila-azor Perdicera	<i>Hieraetus fasciatus</i>	s	S-D	E	V	SPEC 3	E
Aguila Pescadora	<i>Pandion haliaetus</i>	p	s-m-i		E	SPEC 3	R
Cernícalo Primilla	<i>Falco naumanni</i>	e	E	E	V	SPEC 1	(V)
Cernícalo Vulgar	<i>Falco tinnunculus</i>	S-l	S-D/m-i		NA	SPEC 3	D
Esmerejón	<i>Falco columbarius</i>	i-p	I		K		S
Alcotán Europeo	<i>Falco subbuteo</i>	e-p	E	I	K		S
Halcón de Eleonora	<i>Falco eleonora</i>	A	S-m		R	SPEC 2	R
Halcón Peregrino	<i>Falco peregrinus</i>	s-i	S-D/m-i	V	V	SPEC 3	R
Colín de California	<i>Callipepla californica</i>	s?					
Perdiz Roja	<i>Alectoris rufa</i>	S	S		NA	SPEC 2	(V)
Codorniz Común	<i>Coturnix coturnix</i>	E-i-p	S-D/m		NA	SPEC 3	V
Faisán Vulgar	<i>Phasianus colchicus</i>	s?	S?				S
Rascón Europeo	<i>Rallus aquaticus</i>	S-i	S-D/i	I	NA		(S)
Polluela Pintoja	<i>Porzana porzana</i>	A	M		K	SPEC 4	S
Polluela Chica	<i>Porzana pusilla</i>	A	E		K	SPEC 3	R
Guión de Codornices	<i>Crex crex</i>	A	m		I	SPEC 1	V
Gallineta Común	<i>Gallinula chloropus</i>	S	S-D/m-i		NA		S
Calamón Común	<i>Porphyrio porphyrio</i>	s	S		V	SPEC 3	R
Focha Común	<i>Fulica atra</i>	S-l	D/M-l		NA		S
Focha Moruna	<i>Fulica cristata</i>	A	s-D/m-i		E	SPEC 3	E
Gruña Común	<i>Grus grus</i>	i-P	I		V	SPEC3	V
Sisón Común	<i>Tetrax tetrax</i>	S	S-D/i	S	I	SPEC 2	V
Avutarda Común	<i>Otis tarda</i>	S	S-D	S	V	SPEC 1	D
Cigüeñuela Común	<i>Himantopus himantopus</i>	E-p	E/i	I	NA		S
Avoceta Común	<i>Recurvirostra avosetta</i>	i-p-r	E/l		R	SPEC4/3	L
Alcaraván Común	<i>Burhinus oedicnemus</i>	S	S-D/i	I	K	SPEC 3	V
Canastera Común	<i>Glareola pratincola</i>	A	E		V	SPEC 3	E
Chorlitejo Chico	<i>Charadrius dubius</i>	e-p	E/m-i		K		(S)
Chorlitejo Grande	<i>Charadrius hiaticula</i>	p	E/M-i		NA		S
Chorlitejo Patinegro	<i>Charadrius alexandrinus</i>	A	S-D/m-i		K	SPEC 3	D
Chorlito Carambolo	<i>Charadrius morinellus</i>	A	M-i		R		(S)
Chorlito Dorado Americano	<i>Pluvialis dominica</i>	A	R				
Chorlito Dorado Europeo	<i>Pluvialis apricaria</i>	I-P	M-l		NA	SPEC 4	S
Chorlito Gris	<i>Pluvialis squatarola</i>	A	M-i		NA		(S)

Avefría Europea	Vanellus vanellus	s-l-P	S-D/m-i	I			(S)
Correlimos Gordo	Calidris canutus	A	M		NA	SPEC 3	L
Correlimos Tridáctilo	Calidris alba	A	M-i		NA		S
Correlimos Menudo	Calidris minuta	i-p	M-i		NA		(S)
Correlimos de Temminck	Calidris temminckii	A	m-i		NA		(S)
Correlimos Zarapitín	Calidris ferruginea	p	m-i		NA		
Correlimos Común	Calidris alpina	p	m-l		NA	SPEC 3	V
Combatiente	Philomachus pugnax	i-p	M-i		NA	SPEC 4	(S)
Agachadiza Chica	Lymnocyptes minimus	i	m-l		NA	SPEC 3	V
Agachadiza Común	Gallinago gallinago	l-p	S-D/m-l		K		(S)
Agachadiza Real	Gallinago media	A	A			SPEC 2	(V)
Chocha Perdiz	Scolopax rusticola	s-i	S-D/i		K	SPEC 3	V
Aguja Colinegra	Limosa limosa	p	M-i		NA	SPEC 2	V
Zarapito Trinador	Numenius phaeopus	A	M-i		NA	SPEC 4	(S)
Zarapito Real	Numenius arquata	p	m-l		R	SPEC 3	D
Archibebe Oscuro	Tringa erythropus	p	M-i		NA		S
Archibebe Común	Tringa totanus	p	s-D/m-i		NA	SPEC 2	D
Archibebe Fino	Tringa stagnatilis	A	m-i		NA		(S)
Archibebe Claro	Tringa nebularia	p	M-i		NA		S
Andarríos Grande	Tringa ochropus	l-P	m-l		NA		(S)
Andarríos Bastardo	Tringa glareola	p	M-i		NA	SPEC 3	D
Andarríos Chico	Actitis hypoleucos	s-p	S-D/m-i	I	NA		S
Vuelvepedras Común	Arenaria interpres	A	M-i		NA		S
Gaviota Cabecinegra	Larus melanocephalus	i	m-l		R	SPEC 4	S
Gaviota Enana	Larus minutus	A	M		NA	SPEC 3	D
Gaviota Reidora	Larus ridibundus	s-l	S-D/m-l		NA		S
Gaviota de Audouin	Larus audouinii	A	S/m-i		R	SPEC 1	L
Gaviota Cana	Larus canus	A	I		NA	SPEC 2	D
Gaviota Sombría	Larus fuscus	e-l	S-D?/m-l		NA	SPEC 4	S
Gaviota Patiámarilla	Larus cachinnans	i-p	S-D		NA		(S)
Gaviota Tridactila	Rissa tridactyla	A	S-D?/i		R		S
Pagaza Piconegra	Gelochelidon nilotica	p	E/m		V	SPEC 3	(E)
Pagaza Piquirroja	Sterna caspia	A	m-l		R	SPEC 3	(E)
Charrán Patinegro	Sterna sandvicensis	A	S/m-i		R	SPEC 2	D
Charrán Común	Sterna hirundo	r	E/m		R		S
Charrancito Común	Sterna albifrons	A	E/m		R	SPEC 3	D
Fumarel Cariblanco	Chlidonias hybridus	p	E/m-i		V	SPEC 3	D
Fumarel Común	Chlidonias niger	p	E/M		E	SPEC 3	D
Alca Común	Alca torda	A	I		NA	SPEC 4	S
Ortega	Pterocles orientalis	s	S-D	S	V	SPEC 3	V
Ganga Común	Pterocles alchata	s	S-D	S	V	SPEC 3	E
Paloma Bravía	Columba livia	S	S		NA		S
Paloma Zurita	Columba oenas	S-l	S-D/I		I	SPEC 4	S
Paloma Torcaz	Columba palumbus	S-l	S-D/I		NA	SPEC 4	S
Tórtola Turca	Streptopelia decaocto	s	S-D		NA		(S)
Tórtola Común	Streptopelia turtur	E	E/m		V	SPEC 3	D
Cotorra Argentina	Miyopsitta monachus	s?	S?				
Cotorra de Kramer	Psittacula krameri	A?	S?				
Cotorra de Frente Roja	Aratinga erythrogenys	A?					
Cotorra de la Patagonia	Cyanoliseus patagonus	A?					

Cuco	<i>Cuculus canorus</i>	E	E/m	NA		S
Crálo	<i>Clamator glandarius</i>	E	E	K		S
Lechuza Común	<i>Tyto alba</i>	S	S-D/i	I	NA	SPEC 3 D
Autillo	<i>Otus scops</i>	E	E/m		NA	SPEC 2 (D)
Búho Real	<i>Bubo bubo</i>	s	S-D	V	R	SPEC 3 V
Mochuelo Común	<i>Athene noctua</i>	S	S-D/i		NA	SPEC 3 D
Cáрабо Común	<i>Strix aluco</i>	S	S-D		NA	SPEC 4 S
Búho Chico	<i>Asio otus</i>	S	S-D/i		NA	S
Lechuza Campestre	<i>Asio flammeus</i>	i-r	S-D/m-i	I	R	SPEC 3 (V)
Chotacabras Gris	<i>Caprimulgus europaeus</i>	E	E/m		K	SPEC 2 (D)
Chotacabras Pardo	<i>Caprimulgus ruficollis</i>	E	E	I	K	S
Vencejo Común	<i>Apus apus</i>	E	E/m		NA	S
Vencejo Pálido	<i>Apus pallidus</i>	e	E	I	NA	(S)
Vencejo Real	<i>Apus melba</i>	e-p	E/m		NA	(S)
Martín Pescador	<i>Alcedo atthis</i>	s-i-p	S-D/i	I	K	SPEC 3 D
Abejaruco Común	<i>Merops apiaster</i>	E-P	E/m		NA	SPEC 3 D
Carraca	<i>Coracias garrulus</i>	e	E/m	V	R	SPEC 2 (D)
Abubilla	<i>Upupa epops</i>	S-i	E-D/m-i		NA	S
Torcecuello	<i>Jynx torquilla</i>	e-i-p	E/m-i	I	NA	SPEC 3 D
Pito Real	<i>Picus viridis</i>	S	S-D		NA	SPEC 2 D
Pito Negro	<i>Dryocopus martius</i>	A	S	I	R	S
Pico Picapinos	<i>Dendrocopos major</i>	S	S-D		NA	S
Pico Menor	<i>Dendrocopos minor</i>	A	S-D	I	I	S
Calandria	<i>Melanocorypha calandra</i>	S	S-D	I	NA	SPEC 3 (D)
Terrera Común	<i>Calandrella brachydactyla</i>	E	E		NA	SPEC 3 V
Cogujada Común	<i>Galerida cristata</i>	S	S-D?/i		NA	SPEC 3 (D)
Cogujada Montesina	<i>Galerida theklae</i>	S	S		NA	SPEC 3 V
Totavía	<i>Lullula arborea</i>	S	S		NA	SPEC 2 V
Alondra Común	<i>Alauda arvensis</i>	S-I	S-D/m-i		NA	SPEC 3 V
Avión Zapador	<i>Riparia riparia</i>	e-P	E/m	I	I	SPEC 3 D
Avión Roquero	<i>Pyonoprogne rupestris</i>	S	S-D/i		NA	S
Golondrina Común	<i>Hirundo rustica</i>	E-P	E/m		NA	SPEC 3 D
Golondrina Dáurica	<i>Hirundo daurica</i>	e	E/m		NA	S
Avión Común	<i>Delichon urbica</i>	E-P	E/m		NA	S
Bisbita Campestre	<i>Anthus campestris</i>	e-p	E/m		NA	SPEC 3 V
Bisbita Arbóreo	<i>Anthus trivialis</i>	e-p	E/m		NA	S
Bisbita Común	<i>Anthus pratensis</i>	I-P	m-I		NA	SPEC 4 S
Bisbita Alpino	<i>Anthus spinoletta</i>	S-I	S-D/i		NA	S
Lavandera Boyera	<i>Motacilla flava</i>	E-P	E/m		NA	S
Lavandera Cascadeña	<i>Motacilla cinerea</i>	S	S-D/i		NA	(S)
Lavandera Blanca	<i>Motacilla alba</i>	S-I	S-D/m-i		NA	S
Mirlo Acuático	<i>Cinclus cinclus</i>	s	S-D	I	NA	(S)
Chochín	<i>Troglodytes troglodytes</i>	S-i	S/i		NA	S
Acentor Común	<i>Prunella modularis</i>	S-I	S-D/i		NA	SPEC 4 S
Acentor Alpino	<i>Prunella collaris</i>	s	S-D/m-i	I	NA	S
Alzacola	<i>Cercotrichas galactotes</i>	r-A	E/m		K	S
Petirrojo	<i>Erithacus rubecula</i>	S-I-P	S-D/m-i		NA	SPEC 4 S
Ruiseñor Común	<i>Luscinia megarhynchos</i>	E	E/m		NA	SPEC 4 (S)
Pechiazul	<i>Luscinia svecica</i>	s-i-p	S-D/m-i	I	NA	S
Colirrojo Tizón	<i>Phoenicurus ochruros</i>	S-I	S-D?/m-i		NA	S

Colirrojo Real	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>	P	E/m	I	NA	SPEC 2	V
Tarabilla Norteña	<i>Saxicola rubetra</i>	s-P	E/m	I	NA	SPEC 4	S
Tarabilla Común	<i>Saxicola torquata</i>	S-I-P	S/m		NA	SPEC 3	(D)
Collalba Gris	<i>Oenanthe oenanthe</i>	E-P	E/m		NA		S
Collalba Rubia	<i>Oenanthe hispanica</i>	E-P	E/m		NA	SPEC 2	V
Collalba Negra	<i>Oenanthe leucura</i>	s	S-D?	I	NA	SPEC 3	E
Roquero Rojo	<i>Monticola saxatilis</i>	e-p	E/m		NA	SPEC 3	(D)
Roquero Solitario	<i>Monticola solitarius</i>	s	S-D		NA	SPEC 3	(V)
Mirlo Capiblanco	<i>Turdus torquatus</i>	i-p	D/m		NA	SPEC 4	S
Mirlo Común	<i>Turdus merula</i>	S-I	S-D/i		NA	SPEC 4	S
Zorzal Real	<i>Turdus pilaris</i>	i-p	I		NA	SPEC 4	S
Zorzal Común	<i>Turdus philomelos</i>	s-l-p	S-D?/m-i		NA	SPEC 4	S
Zorzal Alirrojo	<i>Turdus iliacus</i>	l-p	I		NA	SPEC 4	S
Zorzal Charlo	<i>Turdus viscivorus</i>	S-I	S-D/i		NA	SPEC 4	S
Ruiseñor Bastardo	<i>Cettia cetti</i>	S	S		NA		S
Buitrón	<i>Cisticola juncidis</i>	s	S-D		NA		(S)
Buscarla Pintoja	<i>Locustella naevia</i>	p	E/m		NA	SPEC 4	S
Buscarla Unicolor	<i>Locustella luscinioides</i>	e-p	E/m	S	R	SPEC 4	(S)
Carricerín Real	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	A	S-D		R		(S)
Carricerín Común	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>	p	M		NA	SPEC 4	(S)
Carricero Poliglota	<i>Acrocephalus palustris</i>	A	m		NA	SPEC 4	S
Carricero Común	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	E-P	E/M		NA	SPEC 4	S
Carricero Tordal	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	E-p	E/m		NA		(S)
Zarcero Pálido	<i>Hippolais pallida</i>	A	E		NA	SPEC 3	(V)
Zarcero Icterino	<i>Hippolais icterina</i>	A	m		NA	SPEC 4	S
Zarcero Común	<i>Hippolais polyglotta</i>	E-P	E/m		NA	SPEC 4	(S)
Curruca Rabilarga	<i>Sylvia undata</i>	S	S-D		NA	SPEC 2	V
Curruca Tomillera	<i>Sylvia conspicillata</i>	e-p	E/m		NA		(S)
Curruca Carrasqueña	<i>Sylvia cantillans</i>	E-p	E/m		NA	SPEC 4	S
Curruca Cabecinegra	<i>Sylvia melanocephala</i>	S	S-D?		NA	SPEC 4	S
Curruca Mirlona	<i>Sylvia hortensis</i>	e-p	E/m	I	NA	SPEC 3	V
Curruca Zarcerilla	<i>Sylvia curruca</i>	A	m		NA		S
Curruca Zarcera	<i>Sylvia communis</i>	E-p	E/m		NA	SPEC 4	S
Curruca Mosquitera	<i>Sylvia borin</i>	E-P	E/M		NA	SPEC 4	S
Curruca Capirotada	<i>Sylvia atricapilla</i>	E-I-P	S-D/M-I		NA	SPEC 4	S
Mosquitero Papialbo	<i>Phylloscopus bonelli</i>	E-p	E/m		NA	SPEC 4	S
Mosquitero Silbador	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	A	M		K	SPEC 4	(S)
Mosquitero Común	<i>Phylloscopus collybita</i>	s-l-P	S-D/m-l		NA		(S)
Mosquitero Musical	<i>Phylloscopus trochilus</i>	P	M		NA		(S)
Reyezuelo Sencillo	<i>Regulus regulus</i>	s-l	S/i		NA	SPEC 4	(S)
Reyezuelo Listado	<i>Regulus ignicapillus</i>	S-I	S-D/i		NA	SPEC 4	S
Papamoscas Gris	<i>Muscicapa striata</i>	e-P	E/m		NA	SPEC 3	D
Papamoscas Cerrojillo	<i>Ficedula hypoleuca</i>	E-P	E/m		NA	SPEC 4	S
Bigotudo	<i>Panurus biarmicus</i>	r-A	S-D		R		(S)
Mito	<i>Aegithalos caudatus</i>	S	S-D		NA		S
Herrerillo Capuchino	<i>Parus cristatus</i>	S	S-D		NA	SPEC 4	S
Carbonero Garrapinos	<i>Parus ater</i>	S	S-D		NA		S
Herrerillo Común	<i>Parus ateruleus</i>	S	S/i		NA	SPEC 4	S
Carbonero Común	<i>Parus major</i>	S	S-D/i		NA		S
Trepador Azul	<i>Sitta europaea</i>	S	S-D		NA		S

Treparriscos	<i>Tichodroma muraria</i>	i	S-D	NA		(S)
Agateador Común	<i>Certhia brachydactyla</i>	S	S	NA	SPEC 4	S
Pájaro Moscón	<i>Remiz pendulinus</i>	S-l	S-D/l	NA		(S)
Oropéndola	<i>Oriolus oriolus</i>	E	E/m	NA		S
Alcaudón Dorsirrojo	<i>Lanius collurio</i>	A	E	NA	SPEC 3	(D)
Alcaudón Real	<i>Lanius excubitor</i>	S	S-D/i	I	NA	SPEC 3
Alcaudón Común	<i>Lanius senator</i>	E-p	E/m	NA	SPEC 2	V
Arrendajo	<i>Garrulus glandarius</i>	S	S-D	NA		(S)
Rabilargo	<i>Cyanopica cyana</i>	S	S-D	NA		S
Urraca	<i>Pica pica</i>	S	S-D?	NA		S
Chova Piquirroja	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>	S	S-D	I	NA	SPEC 3
Grajilla	<i>Corvus monedula</i>	S	S-D?/i	NA	SPEC 4	(S)
Graja	<i>Corvus frugilegus</i>	A	S-D?/l	R		S
Corneja Negra	<i>Corvus corone</i>	S	S-D?	NA		S
Cuervo	<i>Corvus corax</i>	S	S-D	NA		(S)
Estornino Pinto	<i>Sturnus vulgaris</i>	I	S-D/l	NA		S
Estornino Negro	<i>Sturnus unicolor</i>	S	S-D?	NA	SPEC 4	S
Gorrión Común	<i>Passer domesticus</i>	S	S-D	NA		S
Gorrión Moruno	<i>Passer hispaniolensis</i>	S	S-D	NA		(S)
Gorrión Molinero	<i>Passer montanus</i>	S	S-D?	NA		S
Gorrión Chillón	<i>Petronia petronia</i>	S	S	NA		S
Gorrión Alpino	<i>Montifringilla nivalis</i>	A	S-D	NA		(S)
Bengalí Rojo	<i>Amandava amandava</i>	s?	S?			
	<i>Amandava subflava</i>	A?				
Pico de Coral	<i>Estrilda astrild</i>	A?	S?			
Pico de Coral	<i>Estrilda troglodytes</i>	A?	S?			
Monjita de Malaca	<i>Lonchura malacca</i>	A?				
Capuchino Cabeciblanca	<i>Lonchura maja</i>	A?				
Quelea Común	<i>Quelea quelea</i>	A?				
Pinzón Vulgar	<i>Fringilla coelebs</i>	S-l-P	S-D?/m-i	NA	SPEC 4	S
Pinzón Real	<i>Fringilla montifringilla</i>	i	i	NA		S
Verdecillo	<i>Serinus serinus</i>	S-l-P	S-D/m-i	NA	SPEC 4	S
Verderón Serrano	<i>Serinus citrinella</i>	S	S-D	I	NA	SPEC 4
Verderón Común	<i>Carduelis chloris</i>	S-l-P	S-D/m-i	NA	SPEC 4	S
Jilguero	<i>Carduelis carduelis</i>	S-l-P	S-D/m-i	NA		(S)
Lúgano	<i>Carduelis spinus</i>	I-p	I	NA	SPEC 4	S
Pardillo Común	<i>Carduelis cannabina</i>	S-l-P	S-D/m-i	NA	SPEC 4	S
Piquituerto Común	<i>Loxia curvirostra</i>	S	S-D/i	NA		S
Camachuelo Común	<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	i	S-D	NA		S
Picogordo	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>	S-i-p	S-D/l	NA		S
	<i>Parararia coronata</i>	A?				
Escribano Cerillo	<i>Emberiza citrinella</i>	i	S-D/ie?	NA	SPEC 4	(S)
Escribano Soteño	<i>Emberiza cirius</i>	S	S-D	NA	SPEC 4	(S)
Escribano Montesino	<i>Emberiza cia</i>	S	S-D	NA	SPEC 3	V
Escribano Hortelano	<i>Emberiza hortulana</i>	E	E/m	NA	SPEC 2	(V)
Escribano Pigmeo	<i>Emberiza pusilla</i>	A	R			(S)
Escribano Palustre	<i>Emberiza schoeniclus</i>	I-P	S-D/i	I	NA	S
Triguero	<i>Miliaria calandra</i>	S	S-D	NA	SPEC 4	(S)

LISTA SISTEMÁTICA 1996

LISTA SISTEMÁTICA 1996

En esta lista se incluyen todas las especies que han sido citadas en territorio de la Comunidad Autónoma de Madrid aunque no presenten citas en 1996. Las citas publicadas en este Anuario se refieren solamente a las realizadas durante 1996. Para cada especie se proporciona la siguiente información:

NOMBRE CASTELLANO (NOMBRE CIENTÍFICO)

ESTATUS PROVINCIAL: estatus en la C.A.M. Se hace una breve revisión de las citas anteriores a 1996 en las especies muy escasas, para lo que se ha considerado los Noticiarios Ornitológicos de Ardeola, dos antiguas secciones de Ardeola (Sección Breves [Notas] y Sección Breves [Avifauna]), recuperaciones del banco de datos de la Oficina de Anillamiento y citas inéditas recibidas anteriores a 1996. En ciertos casos no ha sido posible conseguir las citas inéditas de algunas especies accidentales, a pesar de ello, estas especies se incluyen en el Anuario al tener la seguridad de la existencia de al menos una cita en territorio de la Comunidad de Madrid. Dichas citas se intentarán publicar en próximos anuarios.

CRITERIO: se especifica el criterio de selección seguido en la publicación de las citas recibidas para el presente anuario, con el objeto de orientar al lector en el envío de citas para futuros anuarios. En citas de interés se incluyen todas aquellas citas de reproducción que aporten nueva información no aparecida en el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad de Madrid (Martí *et al.* 1994), ya sea por no haber sido citada en época de reproducción en una determinada cuadrícula o porque




Figura 1. Numeración de las diferentes cuadrículas UTM (10x10 Km) que cubren el territorio de la Comunidad de Madrid.

la especie pase de reproductor posible a probable o de probable a seguro, indicándose con su correspondiente número la cuadrícula de que se trate (figura I).

CITAS DE INTERÉS 1996: se indica en cada caso localidad, número de individuos, fecha y observador. En algunos casos, cuando se trata de especies en peligro y de colonias, no se especifica la localidad.

En la lista se sigue la nomenclatura y el orden empleados por De Juana (1995) el cual se basa en Voous (1977). Se subrayan las primeras citas de una especie que no estaban publicadas, tanto de 1996 como anteriores.

Para el estatus provincial se sigue el siguiente código:

- A: Accidental. Se presenta con muy poca frecuencia en Madrid
 r: Reproductor ocasional. No se reproduce todos los años en Madrid
 E: Estival. Habitual en primavera y verano, con cifras importantes
 e: Estival. Habitual en primavera y verano, con cifras reducidas
 I: Invernante. Habitual en otoño e invierno en cifras importantes
 i: Invernante. Habitual en otoño e invierno en cifras reducidas
 P: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño), con cifras importantes
 p: Migrante. Habitual durante los pasos migratorios (normalmente en primavera y otoño), con cifras reducidas
 S: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras importantes
 s: Sedentaria. Habitual a lo largo de todo el año con cifras reducidas
 ?: Las observaciones que se refieren a la especie seguramente tengan su origen en aves escapadas de cautividad
 Habitualmente se introduce algún comentario con el fin de describir lo mejor posible el estatus.

Abreviaturas empleadas en el texto de la Lista Sistemática:

ad. = adulto/s	ind. = individuo/s
ej. = ejemplar/es	juv. = juvenil/es
h. = hembra/s	m. = macho/s
inm. = inmaduro/s	pp. = pareja/s

Í N D I C E

Somormujos y Zampullines	86
Cormorán Grande	88
Garzas	89
Cigüeñas	90
Morito, Espátula y Flamenco	91
Anátidas	91
Rapaces	94
Gallináceas	97
Rálidos	98
Grullas	99
Sisón y Avutarda	100
Limícolas	100
Gaviotas	103
Charranes y Fumareles	105
Ganga y Ortega	106
Palomas y Tórtolas	106
Cotorras	107
Cucos	107
Rapaces nocturnas	107
Chatocabras	108
Vencejos	108
Martín Pescador	109
Abejaruco, Carraca y Abubilla	109
Picos	109
Aláudidos	110
Golondrinas	111
Bisbitas y Lavanderas	111
Mirlo Acuático y Chochín	112
Acentores	112
Túrdidos	113
Sílvidos	115
Papamoscas	119
Bigotudo y Mito	119
Páridos	119
Trepador, Treparriscos, Agateador, Pájaro	
Moscón y Oropéndola	120
Alcaudones	120
Córvidos	121
Estorninos	121
Gorriones	122
Fringílicos	123
Escribanos	124

LISTA SISTEMÁTICA

Zampullín Común (*Tachybaptus ruficollis*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, concentración de 51 aves en un tramo de 200 m. el 15.XII (J. de la Puente y B. Molina/SEO-Monticola).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, varias pp. con pollos y varios nidos con huevos el 19.VII (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, reproducción comprobada, 2 ad. con 3 pollos. Pasa como reproductor probable a seguro en la cuadrícula 64 (J. Cilleros).
- Leganés, parque de Polvoranca, presente todo el año y reproducción comprobada de al menos 3 pp. a lo largo de la primavera-verano. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (J.D. Acevedo).

Somormujo Lavanco (*Podiceps cristatus*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Valdemorillo, embalse de Valmayor, 108 ind. el 13.I (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, durante la primavera se comprueba la reproducción de 2 pp. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 37 (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Las Rozas de Puerto Real, presa de Los Morales, 15 juv. y 10 ad. el 20.VII (H. Rodríguez).

Somormujo Cuellirrojo (*Podiceps grisegena*)Estatus provincial: A extremadamente raro con una única cita conocida: Embalse de Pinilla, Lozoya del Valle, 17.I.1987 (*Ardeola* 36[1]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zampullín Cuellinegro (*Podiceps nigricollis*)Estatus provincial: s, r, i. Reproducción en el Embalse de Los Arroyos (Cobo Anula *et al.* 1991).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. entre el 21.I y el 20.III (C. Barcala).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 2 ind. en plumaje nupcial el 18.IV (C. Barcala).
- Aranjuez, confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 1 ave el 17.X (D. Sánchez y T. Velasco).
- San Martín de la Vega, gravera en la finca Los Ángeles, 1 ind. en diferentes fechas: 19.X, 16.XI y 28.XII (J.C. del Moral y B. Molina/SEO-Monticola).
- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ind. el 17.XI (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 5 ind. el 17.XI (J. Cilleros).

Comorón Grande (*Phalacrocorax carbo*)Estatus provincial: I, e accidental. Con una única cita de reproducción: intento de reproducción en el embalse de Santillana, Manzanares el Real, en el verano de 1989, finalmente fracasa. (*Ardeola* 36[2]).

Criterio: cifras destacables, fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, embalse, 40 ind. el 13.I, 50 el 6.III y 35 el 24.XII; primera observación de "otoño" de 1 ind. el 21.VIII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Leganés, parque La Polvoranca, 1 ind. el 28.III (J. Cilleros).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 juv. el 5.V (J.A. Cuevas).
- Rivas-Vaciamadrid, dormidero de El Porcal, censos en distintas fechas: 250-300 ind. el 4.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes), 61 el 19.X, 367 el 16.XI y 388 el 28.XII (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, primer grupo observado de varios ind. el 21.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola) y 70 ind. el 17.XI (J. Cilleros).
- Aldea del Fresno, finca el Santo, más de 96 ind. entran a un dormidero situado en unos árboles junto al río Alberche (J. Peña).

Avetoro Común (*Botaurus stellaris*)Estatus provincial: A con citas en enero, abril, octubre, noviembre y diciembre de individuos aislados en años anteriores (*Ardeola* 32[2], 34[2], 41[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Avetorillo Común (*Ixobrychus minutus*)

Estatus provincial: e, i muy escaso.

Criterio: fechas extremas, de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. el 11.II (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Campillo, 2 m. ad. el 30.III (F.J. Peñalba y J.C. Colubi).
- Aranjuez, carrizal de Villamejor, 1 ind. el 17.IV (J.A. Cuevas).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 2-3 ind. el 22.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 90 (J.A. Cuevas).
- Ciempozuelos, gravera Las Ariadas, 1 ave el 2.VIII (T. Velasco).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 1 ej. el 1.XI (J.M. Herranz y P.M. Fernández Fernández).

Martinete Común (*Nycticorax nycticorax*)

Estatus provincial: E, i muy escaso. Con citas invernales en febrero (G. Blanco).

Criterio: fechas extremas, invernada y citas de interés.

- Alcalá de Henares, finca el Encín, 3 ind. el 20.III (J.A. Cuevas).
- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, 1 juv. el 14.VI (T. Velasco).
- Valdemorillo, río Aulencia, 1 ad. el 15.VI (C. Domínguez y F. Roviralta).
- El Pardo, varios ind. el 16.VI (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola), y 3 en el río Manzanares el 30.VII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Velilla de San Antonio, graveras, 2 juv. el 29.IX (J. Cilleros).
- Ciempozuelos, río Jarama, 2 ad. el 18.XI (T. Velasco).
- Aranjuez, río Tajo en Puente de Añover, 4 ad. el 25.XI y 7 ad. el 27.XI (T. Velasco).
- Aranjuez, río Tajo en Barciles Bajo, 2 ad. y 2 juv. el 26.XI (T. Velasco).

Garcilla Cangrejera (*Ardeola ralloides*)Estatus provincial: A, con citas en los meses de abril, mayo y agosto (*Ardeola* 34[2], 36[2], 42[2] y G. Blanco).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Garcilla Bueyera (*Bubulcus ibis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, el Porcal, dormitorio de unos 100 ind. el 4.II y 500 el 18.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Rivas-Vaciamadrid, basurero de Valdemingómez, 1000 ind. el 18.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Garcera situada al Sur de Madrid, 230 pp. criando el 12.V (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Garceta Común (*Egretta garzetta*)

Estatus provincial: s.

Criterio: cifras destacadas y citas de interés.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 13.IV (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 ind. el 24.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- El Pardo, embalse, 1 ind. el 26.IV (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Garceta Grande (*Egretta alba*)Estatus provincial: A con citas anteriores a 1996 en abril, agosto, octubre y noviembre (*Ardeola* 34[2], 36[2]; J. Marchamalo y J. Gamonal).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Garza Real (*Ardea cinerea*)

Estatus provincial: e muy escasa, l.

Criterio: cifras destacables, citas estivales y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 3 ind. el 8.V (J.A. Cuevas).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 2 juv. el 24.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 2 ind. el 7.VII (J. Balse).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, juv. pidiendo alimento a ad. el 20.VII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Lozoya, embalse de Pinilla, 1 ind. el 10.VIII (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, grupo de 22 ind. el 10.X (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Garza Imperial (*Ardea purpurea*)

Estatus provincial: e, p, i accidental con una cita anterior a 1996 en diciembre (*Ardeola* 36 [2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Belvis del Jarama, graveras, 1 ind. el 23.IV (J.A. Cuevas).
- Fuentidueña del Tajo, 1 ind. pescando en el río Tajo el 12.V (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Carrizal al sur de Madrid, 2 pp. construyendo nido el 14.V (J.A. Cuevas).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 pp. el 16.VII, un ind. el 24.VII (J. de la Puente, A. Bermejo y J. Seoane/SEO-Monticola).
- El Pardo, río Manzanares, 1 ind. el 19.VII (D. Langlois/GOEP).

Cigüeña Negra (*Ciconia nigra*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: cifras importantes, fechas extremas e invernales, citas de interés.

- El censo realizado por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid da un total de 6 parejas. Esto no implica que todas críen con éxito (Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Madrid, vertedero de Valdemingómez, primera cita de invernada: 1 ind. de primer invierno acude a comer al vertedero junto a las cigüeñas blancas y duerme con ellas en el río Manzanares al menos entre el 27.XI.1995 y el 7.I.1996 (J. Marchamalo, J.M. Traverso, J.J. Gamonal, T y J.A. López Septiem).
- El Pardo, cerro Marmota, 8 ind. el 1.IX (D. Langlois/GOEP).
- San Martín de Valdeiglesias, embalse de Picadas, 1 ind. el 19.X (R. Ruiz).



Cigüeña Negra en el vertedero de Valdemingómez, 7 de enero de 1996 (foto: J.M. Traverso)

Cigüeña Blanca (*Ciconia ciconia*)

Estatus provincial: E, S sólo una parte de la población.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Bustarviejo, 1 pp. saca adelante dos pollos en la torre de la iglesia; en 1995 intento la reproducción pero el único pollo muere antes de abandonar el nido; la reproducción en este punto era habitual hasta los años 80 (D. Díaz Díaz).
- Alcalá de Henares, finca Espinillos, 45 ind. el 23.VI (J.A. Cuevas).
- Meco, iglesia, concentración de 52 ind. la mayor parte juv. el 19.VIII (J.A. Cuevas).
- El Pardo, embalse, grupo de 200 ind. 27.VII y 300 el 21.VIII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, concentración de 326 ind. el 8.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, finca El Porcal, concentración de 200 ind. el 19.IX (C. Barcala).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, grupo de 40 ind. el 1.XI (J.A. Calleja, V. Azcoitia y R. Gómez de la Cuesta/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, junto a gravera en la finca Los Ángeles, dormitorio de 224 ind. el 2.XI y 258 el 16.XI (J.C. del Moral y B. Molina/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 205 ind. el 16.XI (J.C. del Moral y B. Molina/SEO-Monticola).
- Chapinería, 1 m. que cría en la torre del pueblo permanece todo el invierno, lo cual no resulta habitual en la localidad (J. Peña).
- San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa, en estas localidades no invernan pero los machos empiezan a llegar el 20.XII (J. Peña).

Morito Común (*Plegadis falcinellus*)

Estatus provincial: A con citas en marzo, mayo y septiembre (*Ardeola* 3, 36[2], 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Espátula Común (*Platalea leucorodia*)

Estatus provincial: A en migración con citas en septiembre y octubre (*Ardeola* 35[2]; J. Marchamalo, J.M. Traverso y J. de la Puente).

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Pardo, embalse, primera cita en paso prenupcial: 1 ind. el 12.IV y 28 IV; y 5 ind. el 12.V (D. Langlois/GOEP).

- Rivas-Vaciamadrid, finca El Porcal, 1 ej. en vuelo junto a unas 200 cigüeñas blancas el 19.IX (C. Barcala).

Flamenco Común (*Phoenicapterus ruber*)

Estatus provincial: A extremadamente raro con una sola cita conocida: Manzanares el Real, embalse de Santillana, 26 ind. el 17.X.1971 (*Ardeola* 16).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cisne Negro (*Cygnus atratus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad con poblaciones salvajes en Australia y Nueva Zelanda (Madge y Burn 1992). Con una cita anterior en el embalse de Santillana en marzo de 1992 (*Ardeola* 40[1]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 1 ad. el 21-I (J. de la Puente, A. Bermejo, J. Seoane y J.M. Jiménez López/SEO-Monticola).

Ansar Campestre (*Anser fabalis*)

Estatus provincial: A con dos citas conocidas: en diciembre de 1990 en El Porcal y en noviembre de 1994 en el embalse de Santillana (*Ardeola* 41[2], 37[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ansar Común (*Anser anser*)

Estatus provincial: i, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Pardo, embalse, 3 ind. el 13.I (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, más de 1000 ej. pasan volando hacia el norte el 18.II (B. Molina/SEO-Monticola).

- Bustarviejo, grupo de 71 ind. el 18.II (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

- La Cabrera, sierra de La Cabrera, grupo de 64 ind. volando en dirección E-N el 3.III (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 3 ind. el 28.I (J. Cilleros) y 1 ind. el 4.V (J.A. Cuevas).

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 63 ind. el 28.I (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes); 5 el 10.II (J. Cilleros); 1 ind. el 25.II (D. Díaz Díaz y O. Martín Díaz), y 1 ind. el 17.XI (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, 4 ind. el 19.III volando en dirección norte (C. Sanz Pérez y A. Lorenzo).

- Aranjuez, Las Infantas, río Tajo, 2 aves el 25.XI (T. Velasco).

- Aranjuez, río Tajo en Valdebajares, 1 ind. el 26.XI y 14 ind. en barbechos (T. Velasco).

Barnacla Canblanca (*Branta leucopsis*)

Estatus provincial: A posiblemente escapado de cautividad con poblaciones salvajes más próximas en Escocia e Irlanda (Madge y Burn 1992). Dos citas anteriores: en diciembre de 1985 en una gravera de San Martín de la Vega y en enero de 1990 en el embalse de Santillana (*Ardeola* 34[2], 37[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ganso del Nilo (*Alopochen aegyptiacus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad con poblaciones naturales en África tropical y asilvestradas en Gran Bretaña (Madge y Burn 1992).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Velilla de San Antonio, graveras, 1 ind. el 29.VII (J.C. del Moral/SEO-Monticola) y seguramente el mismo el 3.VIII (J.A. López Septiem y J. Marchamalo).

Tarro Canelo (*Tadorna ferruginea*)

Estatus provincial: A posiblemente escapado de cautividad. Con una cita de hasta 6 ind. en el embalse de Santillana en marzo y abril de 1994 (*Ardeola* 43[1]).

Criterio: se publican todas las citas recibidas pero hay que tener en cuenta que todas ellas deberían de ser revisadas por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife ya que esta especie resulta muy similar al Tarro Africano (*Tadorna cana*), y por lo tanto deberían enviarse con una descripción detallada.

- El Pardo, río Manzanares, 2 ind. el 27.I, 1 el 9.IV, 2 el 14.IV y 1 el 4.V (A. Rodríguez Pérez, J.A. Díaz Reyes y D. Langlois/GOEP).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 m. y 2 h. el 3.II (J. Gamonal), observados también los días 4.II y 24.II (D. Martín Fouz y E. Martínez González).

Tarro Blanco (*Tadorna tadorna*)

Estatus provincial: i muy escaso e irregular con citas en enero, febrero y marzo (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Pardo, embalse, 2 ind. el 14.I (D. Langlois/GOEP).
- Leganés, laguna de María Pascuala en el parque de la Polvoranca, 1 ind. el 14.I (B. Molina/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, gravera en la finca Los Angeles, 1 ind. el 2.XI (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ind. el 16.XI (J.C. del Moral y B. Molina/SEO-Monticola).

Silbón Europeo (*Anas penelope*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 1 m. el 13.I (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Ánade Friso (*Anas strepera*)

Estatus provincial: s, i.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción.

- El Escorial, lagunas de Las Radas, 1 m. el 24.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, ad. con pallos el 20.VII (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).
- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 50 ej. el 17.XI (J. Cilleros).

Cerceta Común (*Anas crecca*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, arroyo Martín Román, 1 h. el 9.I (T. Velasco).
- Rivas-Vaciamadrid, junto a la Presa del Rey, 1 m. el 23.VI (J.A. Cuevas).

Ánade Azulón (*Anas platyrhynchos*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: cifras importantes de invernada.

- El Escorial, embalse de Valmayor, 281 ej. el 13.I (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Ánade Rabudo (*Anas acuta*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 5 ind. el 28.I (J. Cilleros) y 40-50 el 4.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 1 m. el 3.III (J. Cilleros).

Cerceta Carretona (*Anas querquedula*)

Estatus provincial: p escasa en marzo y agosto (G. Blanco y J. Marchamalo).

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Pardo, embalse, grupo de 30 ind. el 30.VII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Velilla de San Antonio, gravera, 1 ind. el 5.X (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 1 ind. el 13 y 19.X (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Cuchara Común (*Anas clypeata*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso, l. Con reproducción confirmada en 1984 y 1991 (*Ardeola* 32[2], 38[2], 40[1]).

Criterio: cifras importantes de invernada, citas de reproducción y estivales.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, última cita el 14.IV (J. de la Puente y L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- Aranjuez, junto a confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 1 m. el 5.VI (T. Velasco).

Pato Colorado (*Netta rufina*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, gravera Las Arriadas, 1 m. el 11.II (B. Molina/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal, 2 ind. el 3.III y 7 el 29.IX (J. Cilleros).
- Rivas-Vaciamadrid, río Manzanares junto a la Presa del Rey, 1 h. con 4 pollos y otra con 5 pollos el 7.V; 3 pp. el 18.V; y 2 m. y 1 h. con un pollo el 31.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J.A. Cuevas; J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Ciempozuelos, gravera Las Arriadas, 1 pp. el 25.IV (J.A. Cuevas).
- Velilla de San Antonio, gravera, 2 ind. el 19.X (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 2 ind. el 19.X (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez junto al río Jarama, 2 ind. el 16.XI (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Aranjuez, río Tajo en Casa Cisneros, 1 pp. el 26.XI (T. Velasco).

Porrón Europeo (*Aythya ferina*)

Estatus provincial: s reproductor, l.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de reproducción y estivales.

- Aranjuez, Mar de Ontígola, unos 300 ind. el 6.I (T. Velasco).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 620 ind. el 1.XI y 874 el 16.XI (B. Molina y J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Porrón Pardo (*Aythya nyroca*)

Estatus provincial: i muy escaso con años sin registros. Citas en enero, febrero, marzo, mayo, noviembre y diciembre; una de 17 ej. en noviembre (*Ardeola* 31, 35[2], 37[2], 40[1], 41[1], 41[2], 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 5 ind. entre el 4.I y el 22.II (C. Barcala).
- Aranjuez, Mar de Ontígola, 2 ind. el 6.I (T. Velasco).

Porrón Moñudo (*Aythya fuligula*)

Estatus provincial: i escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Mar de Ontígola, unos 12 ind. el 6.I (T. Velasco).
- Ciempozuelos, gravera de Soto del Parral o de Las Arriadas, fecha tardía de 1 pp. el 25.V mostrándose alarmado el m. ante la presencia de una Gaviota Sombria (M. Arcas).
- El Pardo, río Manzanares, 1 m. juv. 16.X (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Porrón Bastardo (*Aythya marila*)

Estatus provincial: A muy raro con sólo tres citas anteriores: en agosto de 1977 en el embalse de Santillana, abril de 1992 en Titulcia y febrero de 1995 en el embalse de El Vellón (*Ardeola* 24, 40[1], 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Porrón Osculado (*Bucephala clangula*)

Estatus provincial: A muy raro con cuatro citas anteriores: en abril de 1956 en el embalse de Santillana, noviembre de 1975 en El Vellón, enero de 1994 en la gravera de El Porcal y enero de 1995 en una gravera de Velilla de San Antonio (*Ardeola* 3, 22, 41[1], 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Serreta Mediana (*Mergus serrator*)

Estatus provincial: A muy rara con dos citas anteriores: en diciembre de 1993 en una gravera de Arganda y diciembre de 1994 en el embalse de Los Arroyos (*Ardeola* 41 [1], 42 [2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Canela (*Oxyura jamaicensis*):

Estatus provincial: A extremadamente rara y posiblemente escapada de cautividad, con poblaciones asilvestradas más cercanas en Gran Bretaña y naturales en América (Madge y Burn 1992). Una sola cita anterior: enero de 1994 en el río Jarama en Aranjuez (*Ardeola* 43 [1]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Malvasía Cabeciblanca (*Oxyura leucocephala*)

Estatus provincial: A con citas casi anuales en los últimos años y con citas anteriores en julio, agosto, octubre, diciembre, enero y febrero; destaca una de hasta 17 aves en julio de 1989 (*Ardeola* 36 [2], 41 [2], 42 [2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, El Porcal, 1 m. muerto por colisión con cables el 31.VIII (J. Marchamalo, J.A. López Septiem, J. Gamonal y L. Mesonero).

- San Martín de la Vega, gravera en la finca Los Ángeles, 1 ind. h. o juv. el 19.X y el 16.XI (J.C. del Moral y B. Molina/SEO-Monticola).

Abejero Europeo (*Pernis apivorus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, observación en paso el 4.IV (J. Cano).

- El Pardo, 1 ind. el 8.IV (D. Langlois/GOEP).

- San Lorenzo de El Escorial, bosque de La Herrería, 2 ind. sobrevolando el melojar el 1.VI (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Soto del Real, nido con pollos y ad. en vuelo el 10.VII (L.M. Sánchez de la Fuente y J. Seoane/SEO-Monticola).

- Miraflores de la Sierra, puerto de La Morcuera, 1 ind. en paso el 10.VIII (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

- Alameda del Valle, 1 ind. el 15.VIII (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

- Soto del Real, cita tardía de un ind. el 1.XI (J.A. Calleja, V. Azcoitia y R. Gómez de la Cuesta/SEO-Monticola).

Elanio Común (*Elanus caeruleus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar Viejo, 1 ind. en hábitat de cría adecuado el 3.VII (J. Ruiz Esteban/SEO-Monticola).

- Villamanta, dehesa de Valquejigoso, 1 ad. el 17.X (J.M. Traverso).

- El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 30.XI (A. Rodríguez Pérez, J.A. Díaz Reyes y D. Langlois/GOEP).

Milano Negro (*Milvus migrans*)

Estatus provincial: E reproductor, P. Con citas invernales de 1 ind. en los inviernos 1985-86, 86-87 y 87-88 (*Ardeola* 36 [2]).

Criterio: fechas extremas, concentraciones y citas de interés.

- Valdeporres del Jarama, 1 ej. el 2.III (J.D. Acevedo).

- Buitrago de Lozoya, primera observación de 1 ind. el 14.III (J.A. Sanz).

- El Pardo, río Manzanares, 1 ind. el 22.III (D. Langlois/GOEP).

- Valverde de Alcalá, 2 ind. se meten en un pequeño pinar de *Pinus halepensis* el 30.III (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

- Soto del Real, 1 ind. el 12.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).

- Valdemorillo, 1 ind. el 14.IV (E. Angulo y A. Polvarinos).

- El Pardo, grupo de 70 ind. en vuelo el 26.IV y dormitorio de 200 ind. a orillas del embalse el 26.VI (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- El Escorial, junto a las lagunas de Las Radas, grupo de 15 aves cicleando el 24.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Madrid, plaza de Legazpi, 1 ind. el 7.VIII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- Colmenar Viejo, basurero, fecha tardía de 1 ind. el 8.X (J. Marchamalo, G. Blanco, J. de la Puente y A. Bermejo).

Milano Real (*Milvus milvus*)

Estatus provincial: s reproductor, 1.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Alalpará, 25-30 ej. en dormidero en chopos el 7.I (D. D. Rueda Andrés).
- Aranjuez, río Tajo en Aceca, 1 ave el 26.XI (T. Velasco).

Quebrantahuesos (*Gypaetus barbatus*)

Estatus provincial: extinguido como reproductor, accidental.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Alimoche Común (*Neophron percnopterus*)

Estatus provincial: p. Extinguido como reproductor, aunque hay noticias sin confirmar de 1 pp. en los últimos años.

Criterio: todas las citas recibidas.

- La Cabrera, cancho de La Bola, inm. el 31.V (J.A. López Septiem).
- Guadalupe de la Sierra, 1 ind. de 2º o 3º año el 19.VI (C. Sanz Pérez y A. Lorenzo).

Buitre Leonado (*Gyps fulvus*):

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Carabaña, 7 ind. el 19.IV (J.A. Cuevas).
- Nidificación en árbol, 1 pp. cría en un Pino Resinero (*Pinus pinaster*) en un antiguo nido de Buitre Negro dentro de una pequeña colonia de Buitre Negro (J. Peña).

Buitre Negro (*Aegypius monachus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- El Pardo, cerro Marmota, 29 ind. el 11.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Fresno de Torote, 1 ind. el 29.III (J.A. Cuevas).

Culebrera Europea (*Circaetus gallicus*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Arganda, cortados de yesos, 1 ind. el 11.III (D. Díaz Díaz y O. Martín Díaz).
- Soto del Real, 1 ind. el 15.III (J. Seoane y L. Arqueros/SEO-Monticola).
- Aranjuez, arroyo Cavina, primera cita del año: 1 ad. el 17.III (M.J. Martínez).
- Bufrago de Lozoya, 1 pp. el 18.III (J.A. Sanz).
- Bustarviejo, Mondalindo, 2 ind. el 24.III (D. Díaz Díaz y O. Martín Díaz).

Aguilucho Lagunero Occidental (*Circus aeruginosus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, 4 pp. el 28.III (E. Angulo y A. Polvorinos).
- Colmenar de Oreja, arroyo Pedrea, 1 pp. el 18.IV (J.A. Cuevas).

Aguilucho Pálido (*Circus cyaneus*)

Estatus provincial: s reproductor, i.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- El censo realizado por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid en el sector noreste de Madrid indica un total de 21 pp. (Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

Aguilucho Cenizo (*Circus pygargus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- El censo realizado por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid en el sector noreste de Madrid da un total de 118 pp. (Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).

Azor Común (*Accipiter gentilis*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- Aranjuez, río Tajo en finca Barciles, 1 h. el 26.XI (T. Velasco).

Gavilán Común (*Accipiter nisus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Busardo Ratonero (*Buteo buteo*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Águila Imperial Ibérica (*Aquila adalberti*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: citas de interés.

- El censo realizado por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid da un total de 29 pp., lo que no implica que todas críen con éxito (Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- El Pardo, 6 ind. juntos (2 juv. y 4 ad.) sobrevuelan una carroña de ciervo junto a 15 buitres leonados y 7 buitres negros el 25.I (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- El Pardo, Esquinazo, 5 ad. en vuelo a la vez el 17.II (D. Langlois/GOEP).
- Valdemaqueda, 4 ind. juntos (2 de 1º año y 2 de 2º) en un pinar el 30.XI (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Una pp. saca adelante 4 pollos en los encinares del suroeste (J. Peña).

Águila Real (*Aquila chrysaetos*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- El censo realizado por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid indica un total de 11-13 pp., lo que no implica que todas críen con éxito (Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Fresno de Torote, río Torote, 1 juv. el 18.I (D. D. Rueda Andrés).
- El Pardo, 1 inm. el 13.IV (D. Langlois/GOEP).
- Carabaña, inm. el 20.IV (J.A. Cuevas).

Aguilla Calzada (*Hieraetus pennatus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Aranjuez, arroyo Cavina, primera cita del año: 1 ad. el 17.III (M.J. Martínez).
- Villaviciosa de Odón, 1 ind. el 30.III (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- El Pardo, primera observación de 1 ind. el 31.III (D. Langlois/GOEP).
- Soto del Real, 1 ind. el 12.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 ind. el 5.V (J.A. Cuevas).
- Torremocha del Jarama, 1 pp. saca un pollo en 1996 y también se reproduce en años anteriores (1993, 94 y 95). Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 23 (F. Roviralta).

Águila-azor Perdicera (*Hieraetus fasciatus*)

Estatus provincial: s reproductor muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El censo realizado por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid da un total de 1 pareja (Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- En varias visitas al territorio ocupado de la Comunidad de Madrid se comprueba el éxito de la cría de este año: crían 2 pollos (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Valdemorillo, 1 ad. el 14.IV (E. Angulo y A. Polvorinos).

Águila Pescadora (*Pandion haliaetus*)

Estatus provincial: p. Con una cita invernante en el embalse de Santillana en diciembre de 1991 (*Ardeola* 38[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ind. el 8.IX (F.J. Martínez de Aramayona).
- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 1 ad. el 28.XI (J.M. Traverso).

Cernícalo Primilla (*Falco naumanni*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Fresno de Torote, 3 ej. el 18.II y 8 el 5.III (D. Rueda Andrés).
- Bustarviejo, 1 ind. el 24.II (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- Torres de la Alameda, 2 m. y 2 h. cazando en cultivos el 30.III (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Campo Real, 6 ind. en cultivos el 21.VIII (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Cernícalo Vulgar (*Falco tinnunculus*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Esmerejón (*Falco columbarius*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, 1 ind. al atardecer cazando pájaros en el dormidero situado en el carrizal el 10.XI (J. de la Puente, A. Bermejo y J. Seoane/SEO-Monticola).
- Santa María de la Alameda, 1 h. el 15.X (J. Marchamalo, L. Santras y A. Rey).
- Rivas-Vaciamadrid, cortados del Manzanares junto a la Casa de los Conejos, 1 m. el 14.X (G. Blanco).
- Navalcarnero, carretera a Sevilla la Nueva, 1 m. ad. el 18.XII (J.M. Traverso).

Alcotán Europeo (*Falco subbuteo*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Navas del Rey, primera observación el 27.III (J. Peña).
- Rascacña, laguna de Peñalara, 1 ind. el 14.IX (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 13.X (J. Pinilla).

Halcón de Eleonora (*Falco eleonora*)

Estatus provincial: A con una sola cita anterior en Valdemaqueda de hasta 20 ind. en paso en junio de 1994 (*Ardeola* 41 [2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Meco, La Noguera, 6 ind. el 5.VI (J. Marchamalo y J.M. Traverso).

Halcón Peregrino (*Falco peregrinus*)

Estatus provincial: s, reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- El censo realizado por la Agencia de Medio Ambiente de Madrid da un total de 39 territorios ocupados, 35 pp. funcionales, 2 pp. irregulares, 2 territorios con presencia de un sólo ave (Agencia de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid).
- Madrid, casco urbano, invernada de una h. en Plaza de España, observada repetidamente en posadero entre XII.1995 y V.1996, en varias ocasiones junto a un m. (L. Picazo).
- Bustarviejo, 1 ind. el 19.II (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- El Escorial, 1 h. ad. arrebatada en vuelo un conejo a un Busardo Ratónero el 8.V (C. Palacín).

Colín de California (*Callipepla californica*)

Estatus provincial: s muy escaso procedente de sueltas para caza. Citadas varias pp. en 1989 en Arroyomolinos y reproducción comprobada en Móstoles en junio de 1992 (*Ardeola* 36 [2], 40 [1]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Perdiz Roja (*Alectoris rufa*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villanueva del Pardillo, junto al río Aulencia, ad. en nido ocupado con 16 huevos el 19.V. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 48 (C. Domínguez, O. Pontón y F. Roviralta).

Codorniz Común (*Coturnix coturnix*)

Estatus provincial: E reproductor, i, p.

Criterio: fechas extremas, citas de invierno y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Faisán Vulgar (*Phasianus colchicus*)

Estatus provincial: s reproductor procedente de sueltas para caza.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Chinchón, laguna de San Juan, 1 h. el 1.XI (B. Molina/SEO-Monticola).

Rascón Europeo (*Rallus aquaticus*)

Estatus provincial: S reproductor, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, presente todo el año (SEO-Monticola).

Polluela Pintoja (*Porzana porzana*)

Estatus provincial: A. Con una sola cita anterior: Velilla de San Antonio, graveras, 1 ej el 22.III y 10.IV (*Ardeola* 35[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Polluela Chica (*Porzana pusilla*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Leganés, Parque de Polvoranca, 1 inm. los días 30.X y 3.XI (J.D. Acevedo y A. López López).



Polluela Chica vista en el Parque de La Polvoranca los días 30 de octubre y 3 de noviembre (foto: A. López López).

Guión de Codornices (*Crex crex*)

Estatus provincial: A. Extinguido como especie migradora en los años cincuenta: varios ejemplares cazados en prados y siembras de Horcajuelo, Montejo de la Sierra, el último en agosto de 1958 (*Ardeola* 6).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gallineta Común (*Gallinula chloropus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras destacables y citas de interés.

Sin citas destacables.

Calamón Común (*Porphyrio porphyrio*)

Estatus provincial: s reproductor, en expansión con primeras citas de 1991 y reproducción comprobada por primera vez en 1995 (*Ardeola* 38[2], 41[2] y 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, aguas abajo de la confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 1 ad. el 9.I (T. Velasco).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 1 ad. en fechas: 8.II, 14.VIII, 1.IX y 23.IX (C. Barcala); 2 ind. en espadañal el 19.X (J.C. del Moral/SEO-Monticola) y 2 ad. el 11.XI (C. Barcala).
- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, 1 ind. el 27.X, 2 el 3.XI, 1 el 15.XII, 2 el 27.XII (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Chinchón, laguna de San Juan, 1 ad. 1.IX y 2 el 26.XII (C. Barcala); 6 ind. el 11.X, dos de ellos construyendo nido (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Mejorada del Campo, laguna de Mejorada, 2 ind. alimentándose el 12.X y el 9.XI (J. Marchamalo y L. Mesonero).
- Aranjuez, río Tajo en Soto de Tardío, 1 ad. el 18.XI (T. Velasco).
- Aranjuez, río Tajo en Algodar, 1 ad. el 25.XI (T. Velasco).
- Aranjuez, río Tajo en Aceca, 2 ad. el 26.XI (T. Velasco).
- Ciempozuelos, gravera de Las Ariadas, 1 ind. en fechas: 4.I (C. Barcala), 19.X, 16.XI y 2 ind. el 1. XI y 28.XII (J.C. del Moral y B. Molina/SEO-Monticola).

Focha Común (*Fulica atra*)

Estatus provincial: S reproductor, I.

Criterio: cifras importantes de invernada y citas de interés.

- El Escorial, lagunas de Las Radas, ad. con 2 pollos el 19.VII (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Leganés, parque de Polvoranca, reproducción comprobada de 2 pp. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 75 (J.D. Acevedo).
- Chinchón, Laguna de San Juan, 508 ind. el 1.XI (B. Molina/SEO-Monticola).

Focha Moruna (*Fulica cristata*)

Estatus provincial: A extremadamente rara con una sola cita conocida que no había sido publicada. En agosto de 1993 en el embalse de Santillana (J.A. López Septiem) y en octubre de 1993 en el mismo lugar (A.J. Fernández Luna/SEO-Monticola). El ave portaba un habero amarillo con inscripción A9, fue liberada en abril de 1992 con dos meses de edad en la Cañada de los Pájaros (Sevilla).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gruña Común (*Grus grus*)

Estatus provincial: i, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, laguna de El Campillo, 45-50 ind. en vuelo el 17.II (J. Blanco y M.J. Castillo).
- El Pardo, 3 bandos en vuelo, sumando un total de unos 600 ind. el 16.II y unas 2000 en dirección NE el 18.II; primera observación de paso postnupcial de 1 ind. el 12.X y 3 el 20.X; y cita de invernada de 3 ind. el 6.XII, 2 ind. el 21.XII y 1 el 25.XII (A. Rodríguez Pérez, J.A. Díaz Reyes y D. Langlois/GOEP).
- Madrid, casco urbano, ind. en paso prenupcial entre el 18.II y el 10.III y en paso postnupcial el 24.XI (J. Cano).
- Colmenar Viejo, grupo de 26 ind. vuelan en dirección SO el 19.X (J. Marchamalo, G. Blanco y J.A. Fargallo).
- Colmenar viejo, basurero, 5 ind. en vuelo en dirección NO el 3.XI (A.J. Fernández Luna/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, 38 ind. en vuelo hacia el sur el 16.XI (B. Molina y J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Nuevo Baztán, urbanización Eurovillas, grupo de 70-80 en dirección SO el 15.XII (F. Bustamante).
- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, formación de 96 ind. sobrevuela la Reserva en dirección NO el 28.XII (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, cortados, 29 ind. vuelan al sur el 28.XII (B. Molina y J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, grupo de unos 40 ind. el 16.XI y 3 grupos de unos 200 ind. el 26.XII (J. Gamonal).

Sisón Común (*Tetrax tetrax*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- Aranjuez, Las Infantas, 10 ind. el 1.XI (J.M. Herranz y P.M. Fernández Fernández).
- Getafe, Base Aérea, 168 ej. el 10.II (J. Cano).

Avutarda Común (*Otis tarda*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

Sin citas destacables.

Cigüeñuela Común (*Himantopus himantopus*)

Estatus provincial: E reproductor, p. Invernante accidental, con una única cita en esta época: El Pardo, diciembre de 1989 (*Ardeola* 37[2]).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, primera cita estival: 1 ind. el 18.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, laguna de Las Esteras, reproducción de 3 pp. que sacan pollos. Pasa de reproductor posible a seguro en la cuadrícula 106 (J.Cano).
- Titulcia, últimas observaciones el 29.VIII (J. Cano).

Avoceta Común (*Recurvirostra avosetta*)

Estatus provincial: i, p, r. Reproducción comprobada en 1995 en Aranjuez (A. Acha y P. Ruiz Rodríguez); invernante accidental: diciembre 1955 (*Ardeola* 7).

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de Valdeiglesias, embalse de San Juan, 7 ind. en paso durante la primera semana de abril; en las mismas fechas, en 1993, 11 ind., lo que parece indicar un débil paso prenupcial por la zona en distintos años (J.C. Illera).

Alcaraván Común (*Burhinus oedicnemus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- El Pardo, orillas del embalse, 20-25 ind. el 26.IV (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Canastera Común (*Glareola pratincola*)

Estatus provincial: A probablemente procedentes de la colonia de Toledo próxima a Algodor (T. Velasco).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlitejo Chico (*Charadrius dubius*)

Estatus provincial: e reproductor, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, río Jarama junto al carrizal de Las Minas, primera cita estival de 1 ind. el 18.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Villaviciosa de Odón, río Guadarrama, 7 ej. con comportamiento de cortejo el 8.IV (J.D. Acevedo).

Chorlitejo Grande (*Charadrius hiaticula*)

Estatus provincial: p muy escaso con citas en abril y agosto (G. Blanco).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlitejo Patinegro (*Charadrius alexandrinus*)

Estatus provincial: A. Con una única cita de reproducción posible en Rivas-Vaciamadrid, El Porcal, una pp. observada en hábitat y época de cría en la primavera de 1989 junto a varias pp. de Chorlitejo Chico (F. Martínez Olivares).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chorlito Carambolo (*Charadrius morinellus*)

Estatus provincial: A en paso postnupcial con tres citas conocidas: Chinchón 1 ind. cazado el 22.X.1968 (*Ardeola* 14); en el embal-

se de Santillana 3 ind. el 13-09-1988 (*Ardeola* 35[2]); y en la Cuerda Larga de la Sierra de Guadarrama, a unos 2.200m de altura 3 ej. el 25.VIII.1992 (*Ardeola* 48[1]).

Criterio: todas las citas recibidas

Sin citas recibidas.

Chorlito Dorado Americano (*Pluvialis dominica*)

Estatus provincial: A sin citas anteriores.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid (pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife): Villamejor, río Tajo, 1 ind. en plumaje de invierno el 8.VI (T. Velasco).

Chorlito Dorado Europeo (*Pluvialis apricaria*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, junto a la confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 28 ind. el 9.I (T. Velasco).

- San Martín de la Vega, 1 ind. sobrevuela cultivos de regadío el 15.XII (J. de la Puente, B. Molina, J. Seoane y J.A. Calleja/SEO-Monticola).

Chorlito Gris (*Pluvialis squatarola*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Avefría Europea (*Vanellus vanellus*)

Estatus provincial: s reproductor, I, P. Primera reproducción en 1990 (*Ardeola* 37[2]).

Criterio: citas de reproducción y cifras importantes de invernada.

- Titulcia, unos 5000 ind. el 27.I (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Correlimos Gordo (*Calidris canutus*)

Estatus provincial: A con una sola cita en mayo de 1995 (*Ardeola* 38[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Tridáctilo (*Calidris alba*)

Estatus provincial: A. La cita más antigua conocida corresponde a 1 ind. con anilla noruega cazado en Madrid capital el 12.X.1951 (Oficina de Anillamiento).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Menudo (*Calidris minuta*)

Estatus provincial: i, p muy escaso con citas en agosto y diciembre (G. Blanco).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera, 2 ind. el 21.VII y 4 el 29.VII (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Correlimos de Temminck (*Calidris temminckii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Zarpitín (*Calidris ferruginea*)

Estatus provincial: p muy escaso en agosto, septiembre y octubre (G. Blanco y J. Marchamalo) y A en invernada en enero (*Ardeola* 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Correlimos Común (*Calidris alpina*)

Estatus provincial: p muy escaso con citas anteriores en agosto (G. Blanco)

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 10 ind. el 22.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Combatiente (*Philomachus pugnax*)

Estatus provincial: i, p muy escaso con citas en febrero, abril, julio, agosto y octubre (G. Blanco y J. de la Puente).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Las Infantas, 15 ind. el 17.IV (J.A. Cuevas).

Agachadiza Chica (*Lymnocyptes minimus*)

Estatus provincial: i.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, carrizal de la Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 ind. el 4.I. (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Galacho de Las Madres, Soto del Lugar, 1 ave el 17.X (D. Sánchez y T. Velasco).

Agachadiza Común (*Gallinago gallinago*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, carrizal de Las Minas, última observación de invernada/paso postnupcial el 27.IV (J. de la Puente y J. Seoane/SEO-Monticola) y primera observación en paso postnupcial/invernada varios ej. el 15.IX (J. Seoane, J.A. Calleja y P. Gómez Garre/SEO-Monticola).

- Valdemoro, cita tardía en el arroyo de La Cañada, 1 ind. el 24.V (J.A. Cuevas).

Agachadiza Real (*Gallinago media*)

Estatus provincial: A. Con dos citas conocidas: Aranjuez, Las Infantas, 1 ej. cazado en octubre de 1954 (*Ardeola* 1); Aranjuez, Puente Largo, 1 ind. el 19.XI.1994 (A. Acha y P. Ruiz), esta última pendiente de homologación por el Comité de Rarezas de SEO/BirdLife.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chocha Perdiz (*Scolopax rusticola*)

Estatus provincial: e, i, p. La reproducción no ha sido comprobada a pesar de haber sido observados vuelos nupciales en los melojares de La Hiruela (G. Blanco).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Aguja Colinegra (*Limosa limosa*)

Estatus provincial: p muy escasa. Con dos citas conocidas: San Martín de la Vega, Puente del Pindoque, grupo de 23 ind. el 10.VI.1993 y 1 ind. el 21.VII (G. Blanco).

Criterio: todas las citas recibidas

Sin citas recibidas.

Zarapito Trinador (*Numenius phaeopus*)

Estatus provincial: A con dos únicas citas conocidas: embalse de Santillana 1 ind. el 5.IV.1970 (*Ardeola* 15); Ciempozuelos, río Jarama junto a Titulcia, 1 ind. el 10.IV.1994 (A. Acha y P. Ruiz).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarapito Real (*Numenius arquata*)

Estatus provincial: p, i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, Aceca, 2 aves en barbechos el 26.XI (T. Velasco).

- Chapinería, 1 ind. junto a un bando de avefrías los días 26, 27 y 28.XII (J. Peña).

- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. el 28.XII (F. Martínez Olivas).

Archibebe Oscura (*Tringa erythropus*)

Estatus provincial: p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Común (*Tringa totanus*)

Estatus provincial: p en paso escaso con citas en abril, agosto, octubre (G. Blanco y J. de la Puente).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, río Jarama, 2 ind. el 8.IV (T. Velasco).
- Aranjuez, Las Infantas, 2 ind. el 17.IV (J.A. Cuevas).
- Aranjuez, Casa Tres Polos, 1 ind. el 30.V (T. Velasco).

Archibebe Fino (*Tringa stagnatilis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Archibebe Claro (*Tringa nebularia*)

Estatus provincial: p muy escaso con citas en abril y agosto (G. Blanco).

Criterio: Todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, río Jarama, 1 ind. el 8.IV (T. Velasco).

Andaríos Grande (*Tringa ochropus*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Andaríos Bastardo (*Tringa glareola*)

Estatus provincial: p muy escaso con citas en los meses abril, julio, agosto y septiembre (G. Blanco).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Andaríos Chico (*Actitis hypoleucos*)

Estatus provincial: s reproductor, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 6 ind. el 10.V (J.A. Cuevas).

Vuelvepiedras Común (*Arenaria interpres*)

Estatus provincial: A extremadamente raro con una sola cita conocida no publicada: Guadaliix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ind. el 12.V.1991 (J. Marchamalo y M. Carro).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Cabecinegra (*Larus melanocephalus*)

Estatus provincial: i muy escaso que pasa fácilmente desapercibido entre el gran efectivo invernante de Gaviota Reidora, durante los inviernos 1994/95 y 1995/96 se realizaron 18 observaciones (Palomares *et al.* 1996). Con una única cita anterior de febrero de 1992 (*Ardeola* 40[1]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, basurero de Valdemingómez, 1 ad. en plumaje invernal el 8.II (C. Barcala).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 1 juv. el 7.IX (J. Marchamalo, J. Gamonal y L. Mesonero).

Gaviota Enana (*Larus minutus*)

Estatus provincial: A escaso aunque con varias citas, la mayoría de aves en paso, en enero, marzo, abril, mayo, agosto y octubre (*Ardeola* 1, 16, 30, 34[2], 37[2], 38[2], 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Gaviota Reidora (*Larus ridibundus*)

Estatus provincial: s reproductora, I. Con primera reproducción con éxito en 1995 (*Ardeola* 42[2]).

Criterio: cifras importantes de invernada y citas estivales y de reproducción.

- Velilla de San Antonio, graveras, 2 ad. en plumaje nupcial el 18.V (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, 4 pp. construyendo nidos en isleta el 7.V, el 24.V se comprueba que la zona ha sido inun-

- dada. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J.A. López Septiem, J. Marchamalo y F. Martínez Olivas).
- Aranjuez, casa Tres Polos, 75 ind. el 30.V (T. Velasco).
 - Velilla de San Antonio, más información sobre la reproducción: el 9.VI ad. echado en una isla, continúa echada el 22.VI siendo depredado el nido por Gaviota Sombria (M. Arcas).
 - El Pardo, río Manzanares, bando de 30 ind. en vuelo el 30.VI (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
 - Manzanares el Real, embalse de Santillana, primer bando de invernantes de unos 300 ind. el 21.IX (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Gaviota de Audouin (*Larus audouinii*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Colmenar Viejo, basurero, 1 ind. con plumaje juvenil trapeado para anillamiento el 26.VIII (J. Marchamalo, G. Blanco, J.A. Fargallo, L. Mesonero y J.C. Rincón).



Gaviota de Audouin trapeada para anillamiento en el basurero de Colmenar Viejo el 26 de agosto (foto: J. Marchamalo).

Gaviota Cana (*Larus canus*)

Estatus provincial: A: tres citas conocidas en enero y febrero, una de hasta 20-25 aves en 1985 (*Ardeola* 32[2], J. Marchamalo y M. Carro).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Rivas-Vaciamadrid, basurero de Valdemingómez, 1 ind. de 1º invierno el 6.III (J. Marchamalo).

Gaviota Sombria (*Larus fuscus*)

Estatus provincial: e no reproductor, l.

Criterio: cifras destacables y citas estivales.

- El Pardo, embalse, 125 ind. el 6.III (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Rivas-Vaciamadrid, gravera de El Porcal, 3 ind. el 4.V (J.A. Cuevas).
- Aranjuez, junto a confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 2 juv. el 05.VI (T. Velasco).
- San Martín de la Vega, río Jarama, 1 inm. el 11.V y 2 inm. el 26.V. (J. de la Puente, J. Seoane y J.M. Jiménez López/SEO-Monticola).
- Velilla de San Antonio, 2 ind. el 22.VI (M. Arcas).
- San Martín de la Vega, gravera en la finca Los Angeles, 220 ind. el 28.XII (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

- Pinto, basurero, unos 1000 ind. el 30.XII (G. Blanco y J. Marchamalo).

Gaviota Patiamanilla (*Larus cachinnans*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ind. de 2º invierno el 28.I (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- El Escorial, lagunas de Las Radas, 2 ad. posados el 24.V (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Colmenar Viejo, basurero, citas de aves en paso, entre 2 y 5 ind. en diez visitas entre el 15.VIII y 13.X (J. Marchamalo y G. Blanco).
- Madrid, basurero de Valdemingómez, entre 1 y 4 ind. en tres visitas entre el 15.X y el 8.XI (J. Marchamalo y G. Blanco).
- Pinto, basurero, 1 ind. de 3º invierno el 30.XII (G. Blanco y J. Marchamalo).

Gaviota Tridáctila (*Rissa tridactyla*)

Estatus provincial: A extremadamente rara con una sola cita conocida: lago de la Casa de Campo, 5 ad. en II.1984, coincidiendo con fuertes temporales en Europa (*Ardeola* 31).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pagaza Piconegra (*Gelochelidon nilotica*)

Estatus provincial: p habitualmente en verano, probablemente con origen en las cercanas colonias de Castilla-La Mancha.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, jardines, río Tajo, 1 ad. el 12.V (T. Velasco).

Pagaza Piquirroja (*Sterna caspia*)

Estatus provincial: A extremadamente raro con una sola cita conocida sin publicar: Lozoya, embalse de Pinilla, 8.IV.1995 (J. Gamonal).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Charrán Patinegro (*Sterna sandvicensis*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 28.IX (J. Marchamalo, G. Blanco y J.A. López Septiem).

Charrán Común (*Sterna hirundo*)

Estatus provincial: r. Primera reproducción comprobada en 1995, una pp. saca 2 pollos (*Ardeola* 42[2])

Criterio: todas las citas recibidas.

- Velilla de San Antonio, gravera el Picón de los Conejos, 1 ej. en plumaje estival el 26.IV (C. Barcala).
- Velilla de San Antonio, graveras Pioneer, 1 pp. fracasa la reproducción por molestias derivadas de la extracción de áridos en el mismo punto del año anterior: el 7.V una pp. en nido y el 24.V nido abandonado (J.A. López Septiem, J. Marchamalo, F. Martínez Olivas y A. Sanz).
- Boadilla del Monte, 1 ad. observado repetidamente en lago artificial a lo largo de tres semanas a partir del 23.VI (J.A. Calleja/SEO-Monticola).

Charrancito Común (*Sterna albifrons*)

Estatus provincial: A extremadamente raro con dos únicas citas conocidas no publicadas en 1990 y 1994 ambas en Velilla de San Antonio (J. Marchamalo, J.M. Traverso y J.A. López Septiem).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Fumarel Cariblanco (*Chlidonias hybridus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Manzanares el Real, embalse de Santillana, 1 ad. el 4.VIII. (C. Sanz Pérez y A. Lorenzo).

Fumarel Común (*Chlidonias niger*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, junto a confluencia de los ríos Tajo y Jarama, 2 ind. el 05.VI (T. Velasco).
- El Pardo, 1 ind. el 10.V (D. Langlois/GOEP).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, 3 juv. el 1.IX y 5 (al menos 3 juv.) el 3.IX (J. Pinilla).

Alca Común (*Alca torda*)

Estatus provincial: A extremadamente rara, con una única cita conocida: 1 ej. cazado en Madrid el 8.II.1971 y anillada en Dyfed, Gran Bretaña el 2.VII.1970 como pollo (Oficina de Anillamiento).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Ortega (*Pterocles orientalis*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Ganga Común (*Pterocles alchata*)

Estatus provincial: s reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Paloma Bravía (*Columba livia*)

Estatus provincial: S reproductora.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Paloma Zurita (*Columba oenas*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Paloma Torcaz (*Columba palumbus*)

Estatus provincial: S reproductora, I.

Criterio: cifras importantes de aves en paso o invernantes y citas de interés.

- Rascafría, puerto de Cotos, bando de unos 700 ind. intenta cruzar el puerto sin conseguirlo por la niebla el 5.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Tórtola Turca (*Streptopelia decaocto*)

Estatus provincial: s reproductor. Las primeras citas son del año 1988 (*Ardeala* 36[2]). Se aconseja precaución al identificar esta especie ya que resulta muy similar a la Tórtola de Collar (*Streptopelia roseogrisea*) y a su forma doméstica, la Tórtola Collariza (*Streptopelia risoria*) por lo que recomendamos consultar bibliografía especializada (García y Gans 1994).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Villamanrique del Tajo, 2 ind. el 3.I (T. Velasco).
- Estremera, urbanización San Pedro, río Tajo, 2 ind. el 3.I (T. Velasco).
- Torrelaguna, varios ind. el 9.III (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- Getafe, casco urbano, 7 ej. el 6.XII (J. Balse).
- Aranjuez, junto al río Tajo, 2 ej. el 3.V (J. Balse).
- Brunete, 2 ind. el 13.V (T. Velasco).
- Fuentidueña del Tajo, 2 ind. el 2.VIII (FGC).
- Torrelodones, cría confirmada, 1 pp. saca 2 pollos y realiza una segunda puesta. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 39 (G. Lucini).
- Titulcia, junto al pueblo, 6 ind. el 28.XII (B. Molina y J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Chapinería, a lo largo de la primavera se localizan más de 20 pp. (J. Peña).

Tórtola Común (*Streptopelia turtur*)

Estatus provincial: E reproductora.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navas del Rey, primera observación el 15.IV (J. Peña).
- Aranjuez, arroyo del Carralejo, primera observación el 17.IV (J.A. Cuevas).

Cotona Argentina (*Myiopsitta monachus*)

Estatus provincial: s reproductora escapada de cautividad. Existen citas en la ciudad de Madrid al menos desde 1985 (*Ardeola* 37 [2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Ciempozuelos, Soto Gutiérrez, 2 ind. el 11.V y 5 el 13.V. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 99 (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Cotona de Kramer (*Psittacula krameri*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Arganda del Rey, laguna del Campillo, 1 ind. el 23.XI (SEO-Monticola).

Cotona de Frente Roja (*Aratinga erythrogenys*)

Estatus provincial: A escapada de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, cortados del Jarama junto a la Boyeriza, 2 ind. comiendo maíz e higos el 28.VIII y 5.X (G. Blanco).

Cotona de la Patagonia (*Cyanoliseus patagonus patagonus*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad con una cita conocida: San Martín de Valdeiglesias, junto al embalse de Picadas el 21.X.1995 (G. Blanco).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Cuco (*Cuculus canorus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Paredes de Buitrago, primera observación del año: 1 ind. el 30.III (J.A. Sanz).
- Montejo de la Sierra, 1 ind. el 31.III (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, río Jarama, primera llegada: se oye 1 ave el 5.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).
- Miraflores de la Sierra, pueblo, primera llegada: se oye 1 ave el 19.IV (M. Toro y V. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).
- Navas del Rey, primera observación el 17.IV (J. Peña).
- Boadilla del Monte, reproducción confirmada al localizarse juv. colicortos. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 61 (J.A. Calleja/SEO-Monticola).

Crialo (*Clamator glandarius*)

Estatus provincial: E reproductor. Con una cita invernal de enero de 1977 (*Ardeola* 22).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navas del Rey, primera observación del año el 10.II (J. Peña).
- Colmenar de Oreja, 1 ind. el 11.II (J. Cano).
- El Pardo, El Faro, 1 ind. el 10.III (D. Langlois/GOEP).
- Soto del Real, varios ind. el 24.III (J. Seoane y L. Arqueros/SEO-Monticola)

Lechuza Común (*Tyto alba*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Autillo (*Otus scops*)

Estatus provincial: E reproductor. Con una cita en invierno de diciembre de 1979 (*Ardeola* 28).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Torrelaguna, se oye 1 ind. el 9.III (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- San Fernando de Henares, Paseo de los Chopos, primera observación del año: 2 ind. el 15.III (J.A. López Septimi).
- Rivas-Vaciamadrid, ribera río Jarama, primera llegada: se oye 1 ave el 16.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Miraflores de la Sierra, primera llegada: se oye 1 ind. el 19.IV (M. Toro y V. Bermejo Bermejo/SEO-Monticola).

Búho Real (*Bubo bubo*)

Estatus provincial: s reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, calle Ramón Gómez de la Serna, observación en pleno casco urbano de 1 ind. el 5.III (J. Balse).
- Fuentidueña de Tajo, ad. e inm. en cortado de yesos el 12.V. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 108 (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Pezuela de las Torres, 1 ad. cantando en cortado calizo el 28.IX y el 12.X (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Mochuelo Común (*Athene noctua*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cárbalo Común (*Strix aluco*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Búho Chico (*Asio otus*)

Estatus provincial: S reproductor.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Lechuza Campestre (*Asio flammeus*)

Estatus provincial: i, r. Con reproducción confirmada en 1983 (*Ardeola* 33[1-2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Chotacabras Gris (*Caprimulgus europaeus*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Chotacabras Pardo (*Caprimulgus ruficollis*)

Estatus provincial: E reproductor.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, cantan varios ind. el 26.IV (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Vencejo Común (*Apus apus*)

Estatus provincial: E reproductor. Con citas invernales en varios años (*Ardeola* 20, 24, 32[2]).

Criterio: fechas extremas y citas de interés. Se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Pálido (*Apus pallidus*), sobre todo con las citas tardías, ya que el Vencejo Pálido presenta una fenología más retrasada respecto a la del Vencejo Común.

- San Martín de la Vega, río Jarama, primera observación de 1 ave el 16.III (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Madrid, Orcasitas, 2 ind. el 23.III (B. Molina/SEO-Monticola).
- El Pardo, más de 40 aves el 8.IV (D. Langlois/GOEP).
- Villaviciosa de Odón, varios ind. el 11.IV (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- Soto del Real, primera observación el 12.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).
- Madrid, casco urbano, primera observación el 4.IV (J. Cano); barrio de Chamberí, primeros ej. el 7.IV (J. Gamonal); Avenida de América, varios ind. el 8.IV (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Navas del Rey, primera observación el 23.IV (J. Peña).
- Madrid, barrio de Chamberí, movimiento de fuga el 7.VII regresando el 9.VII (J. Gamonal).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, última observación de 1 ind. el 25.VIII (J. Pinilla).
- El Pardo, río Manzanares, última observación de 1 ind. el 7.IX (D. Langlois/GOEP).
- Madrid, casco urbano, últimas observaciones, 6 ej. el 9.X y 1 ej. el 13.XI (J. Cano).
- Madrid, Reina Sofía, 1 ind. el 20.X (M.A. Alejo).

Vencejo Pálido (*Apus pallidus*)

Estatus provincial: e reproductor.

Criterio: todas las citas recibidas, se aconseja poner especial atención en la identificación de esta especie por la posible confusión con el Vencejo Común (*Apus apus*), ver "Criterio" en el Vencejo Común.

- Madrid, colegio público Unamuno, 1 ej. entrando al nido en la caja de una persiana el 15.X, al parecer los primeros ind. llegan a la colonia a primeros de marzo y desaparecen en octubre (J. Marchamalo y G. Blanco).

Vencejo Real (*Apus melba*)

Estatus provincial: e reproductor muy escaso, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Colmenar de Oreja, en paso el 19.VIII (J. Cano).

Martín Pescador (*Alcedo atthis*)

Estatus provincial: s reproductor, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villa del Prado, río Alberche, 2 ej. el 14.VI (T. Velasco).

- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, 1 ave el 14.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 84 (T. Velasco).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera cita de ave en paso postnupcial: 1 juv. el 13.VIII (J. de la Puente, A. Bermejo y C. Coletto/SEO-Monticola).

Abejaruco Común (*Merops apiaster*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Soto del Real, primera observación del año de varios ind. el 3.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).

- Navalcarnero, Fuente Bolilla, primera observación de un grupo el 5.IV y última el 12.IX (A. García-Parrado).

- Navas del Rey, primera observación el 6.IV (J. Peña).

- Villaviciosa de Odón, varios ind. el 11.IV (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

- Colmenar de Oreja, primeros ej. el 13.IV y últimos el 8.IX (J. Cano).

- El Pardo, 6 ind. el 12.IV (D. Langlois/GOEP).

- Villanueva de la Cañada, río Aulencia, primera observación del año: 34 ind. el 19.IV (E. Angulo y A. Polvorinos).

- Chinchón, laguna de San Galindo, unos 50 ind. durmiendo en el carrizal el 24.IV (J.A. Cuevas).

- El Escorial, dormitorio en las copas de unos plátanos (*Platanus hispanica*) de varios cientos de ind. el 29.VIII (J. de la Puente/SEO-Monticola).**Carraca** (*Coracias garrulus*)

Estatus provincial: e.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Aranjuez, 1 ind. en tendido eléctrico sobre el río Tajo el 12.V (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

- Navalcarnero, Fuente Bolilla, 1 ej. el 16.VIII (A. García-Parrado).

- Móstoles, el Soto, 1 ej. el 15.IX (A. García-Parrado).

- El Pardo, última cita de 5 ind. el 31.VIII (D. Langlois/GOEP).

- San Martín de Valdeiglesias, sigue sin criar en la zona tras desaparecer como reproductor hace varios años, con observación de 1 pp. el 6 y 8.V (J. Peña).

- Aranjuez, Casa Tres Polos, 1 ind. el 30.V (T. Velasco).

Abubilla (*Upupa epops*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: citas de invernada y citas de interés.

- El Pardo, 1 ind. el 27.I, 6.II, 20.XI y el 24.XII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- Brunete, Arroyo de la Barraca, 1 ind. el 9.XI (J.A. Cuevas).

- Navas del Rey, 1 ind. el 22.XI y el 20.XII (J. Peña).

- Boadilla del Monte, río Guadarrama, 1 ind. el 24.XII (J.A. Calleja/SEO-Monticola).

Torcejuello (*Jynx torquilla*)

Estatus provincial: e, i, p.

Criterio: fechas extremas de paso, citas de reproducción e invernada.

- Madrid, casco urbano, 1 ej. el 7.II (J. Balse).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura en pleno invierno de 1 ind. el 11.II y otro el 24.XI (J. de la Puente, A. Bermejo y J. Seoane/SEO-Monticola)
- Mejorada del Campo, Las Islillas, pp. cantando en tronco de chopo con agujeros el 15.IV (J.A. López Septiem).
- Patones, ribera del río Lozoya, 1 ej. el 1.V (J.M. Herranz y P.M. Fernández Fernández).
- Miraflores de la Sierra, se oye cantar 1 ind. el 5.V (D. Sánchez de Ron y J. de la Puente/SEO-Monticola).
- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, 1 ej. el 14.VI (T. Velasco).

Pito Real (*Picus viridis*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Pito Negro (*Dryocopus martius*)

Estatus provincial: A con citas de XII.1950 y I.1951 en el hayedo de Montejo de la Sierra (*Ardeola* 4, 5) y citado en pinares del Puerto de Canencia en 1991 (Martí *et al.* 1994).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico Picapinos (*Dendrocopos major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Mejorada del Campo, unión ríos Jarama y Henares, primera cita en la zona: 1 pp. el 13.IV (J.A. López Septiem).

Pico Menor (*Dendrocopos minor*)

Estatus provincial: A con citas en El Escorial, Villaviciosa de Odón, Aranjuez y Rozas de Puerto Real (Martí *et al.* 1994 y *Ardeola* 37 [2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Calandria (*Melanocorypha calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Torrera Común (*Calandrella brachydactyla*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cogujada Común (*Galerida cristata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Cogujada Montesina (*Galerida theklae*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Totavía (*Lullula arborea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, reproducción confirmada de varios pp. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 70 (J.C. Atienza).

Alondra Común (*Alauda arvensis*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Colmenar de Oreja, primeros invernantes el 9.XI y últimos el 12.III (J. Cano).

Avión Zapador (*Riparia riparia*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villa del Prado, río Alberche, bastantes ind. el 14.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible (T. Velasco).
- Bustarviejo, continua sin ser ocupada una colonia situada en un gran hoyo producido por una extracción de arena, la colonia esta-
ba constituida por unas 20-30 pp. que criaron por última vez en 1994 (D. Díaz Díaz y O. Martín Díaz).

Avión Roquero (*Phyonoprogne rupestris*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Golondrina Común (*Hirundo rustica*)

Estatus provincial: E, P. Con una cita en diciembre de 1981 (*Ardeola* 29).

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ind. el 22.II (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Navas del Rey, primera observación el 23.II (J. Peña).
- Soto del Real, cerro de San Pedro, 1 ind. el 25.II (J.A. Calleja/SEO-Monticola).
- El Pardo, 1 ind. el 25.II (D. Langlois/GOEP).
- Villaviciosa de Odón, 1 ind. el 1.III (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas, primeras observaciones: varias aves sobrevuelan el río el 3.III (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Colmenar de Oreja, primeras el 3.III y últimas el 9.X (J. Cano).
- Manjirón, 2 ind. el 11.III (J.A. Sanz).
- Chinchón, laguna de San Juan, primeras observaciones de unos 100 ind. el 28.III (A. Polvorinos y E. Angulo).
- Soto del Real, primera observación el 3.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).
- Titulcia, última observación el 10.X (J. Pinilla).

Golondrina Dáurica (*Hirundo daurica*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, embalse, 5 ind. el 9.III (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Villanueva de la Cañada, río Aulencia, primera observación del año: 2 ind. el 19.IV (E. Angulo y A. Polvorinos).

Avión Común (*Delichon urbica*)

Estatus provincial: E, P. Con una cita en enero de 1990 (*Ardeola* 37 [2]).

Criterio: fechas extremas, citas de invernada y citas de interés.

- El Pardo, primera observación de 1 ind. el 13.II y última de 10 ind. el 20.X (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Navas del Rey, primera observación el 27.II (J. Peña).
- El Pardo, embalse, 4 ind. el 1.III y 5 ind. el 6.III (D. Langlois, A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Fuenlabrada, 1 ind. el 25.II (B. Molina/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, río Jarama, carrizal de Las Minas, primeras observaciones: varias aves sobrevuelan el río el 3.III (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).
- Fuenlabrada, plaza de la iglesia, más de 400 nidos el 29.VI (B. Molina/SEO-Monticola).
- Madrid, casco urbano, primeros ind. el 11.III y últimos el 16.X (J. Cano).
- Manjirón, 2. ind el 1.IV (J.A. Sanz).

Bisbita Campestre (*Anthus campestris*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Bisbita Arbóreo (*Anthus trivialis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, primera observación en paso prenupcial el 29.III (D. Langlois/GOEP).
- Robledo de Chavela, ad. con celo el 15.VI. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 58 (C. Domínguez, y F. Roviralta).

Bisbita Común (*Anthus pratensis*)

Estatus provincial: I, P.

Criterio: fechas extremas.

- Madrid, ciudad, últimos ind. el 6.IV y primeros el 12.X (J. Cano).
- Villanueva de la Cañada, río Aulencia, última observación de invernada/paso: 2 ej. el 19.IV (E. Angulo y A. Polvorinos).
- Chinchón, laguna de San Juan, primera cita de 1 ind. el 25.X (J. Pinilla).

Bisbita Alpino (*Anthus spinoletta*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última captura de invernada/paso prenupcial: 1 ind. el 18.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Lavandera Boyera (*Motacilla flava*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés en *M. f. iberiae* y todas las citas en las demás subespecies.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera cita el 18.III (J. de la Puente/SEO-Monticola).
- El Escorial, laguna del arroyo Guatel Primero, cita tardía el 10.XI (J.A. Cuevas).
- Madrid, Ciudad Universitaria, cita invernal: 2 ind. el 12.XII (D. Sánchez de Ron).

Lavandera Cascadeña (*Motacilla cinerea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Soto del Real, casco urbano, dormidero de unos 100 ind. en un árbol situado a la salida de un respiradero de aire caliente el 27.XII (J. Ruiz Esteban/SEO-Monticola).

Lavandera Blanca (*Motacilla alba*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés y todas las citas referentes a la subespecie *yarrellii*.

- Guadalix de la Sierra, embalse de El Vellón, 1 ej. de la subespecie *yarrellii* junto a ind. de la subespecie *alba* el 2.III (J.D. Acevedo).
- Madrid, plaza Conde de Casal, más de 600 ind. en el dormidero de olmos y cipreses el 28.XII (B. Molina/SEO-Monticola).

Mirlo Acuático (*Cinclus cinclus*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Chochín (*Tragodytes tragodytes*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, reproducción confirmada de varias pp. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 70 (J.C. Añenza).

Acentor Común (*Prunella modularis*)

Estatus provincial: S, i.

Criterio: fechas extremas fuera de la Sierra y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última cita de invernada/paso prenupcial el 23.III (J.C. del Moral y J.M. Jiménez López/SEO-Monticola).

Acentor Alpino (*Prunella collaris*)

Estatus provincial: s muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Bustarviejo, 1 ind. el 24.II (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

Alzacola (*Cercotrichas galactotes*)

Estatus provincial: A. Una sola cita conocida: Velilla de San Antonio, probable reproducción, 2 aves el 6.VI.1956 (*Ardeola* 10).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Villamanta, estación de tren, 1 pp. cría con éxito. Segunda cita para la especie en la CAM, además de ser la primera reproducción confirmada. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 72 (J.M. Traverso).

Petirrojo (*Erithacus rubecula*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última cita de invernada/paso prenupcial el 5.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).

- Villa del Prado, El Alamín, río Alberche, observados pollos volanderos y ad. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 84 (T. Velasco).

- San Martín de Valdeiglesias, reproducción confirmada de varias pp. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 70 (J.C. Atienza).

- Alcalá de Henares, El Encín, 1 ind. el 19.VI (J.A. Cuevas).

Ruiseñor Común (*Luscinia megarhynchos*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Chinchón, laguna de San Juan, primera observación el 28.III (A. Polvorinos y E. Angulo).

- El Pardo, 1 ind. el 28.III (D. Langlois/GOEP).

- Navas del Rey, primera observación el 8.IV (J. Peña).

- Soto del Real, varios m. cantando el 12.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera cita de llegada: 1 m. canta el 5.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).

- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	1	4	3	5	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Pechiazul (*Luscinia svecica*)

Estatus provincial: s, i, p.

Criterio: citas de invernada y de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, datos de invernada entre I y II se capturan 9 ej. para anillamiento (J. de la Puente y SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura para anillamiento en paso postnupcial de 1 h. juv. el 24.VIII (J. Seoane, B. Molina, P. Gómez Garre y J.A. Calleja/SEO-Monticola).

- Mejorada del Campo, Presa del Río, cita de invernada de 1 m. ad. el 13.I (M.J. Martínez).

Colirrojo Tizón (*Phoenicurus ochruros*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: fechas extremas en áreas donde no se reproduce y citas de interés.

- Madrid, casco urbano, últimos ej. el 17.III y primeros el 24.X (J. Cano).

Colirrojo Real (*Phoenicurus phoenicurus*)

Estatus provincial: P, r. Reproducción confirmada en Robledo de Chavela (cuadrícula 46) en julio de 1993, se observan 2 pollos (G. Lucini).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Villanueva de la Cañada, río Aulencia, observación de 1 m. en paso el 19.IV (E. Angulo y A. Polvorinos).

- La Puebla, 1 ind. el 18.IV (J.A. Sanz).

- Guadalupe de la Sierra, dehesa de Moncalvillo, 1 ind. el 29.VIII (H. Rodríguez).

- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (Juan Carlos del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	0	0	12	10	-	15	2	0	0	0	0	0	0

Tarabilla Norteña (*Saxicola rubetra*)

Estatus provincial: s muy escasa en la Sierra, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Valdetorres del Jarama, citas en ambos pasos, 1 pp. el 20.IV y 1 ind. el 31.VIII (M. Arcas).

Tarabilla Común (*Saxicola torquata*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: citas de interés.

Sin citas destacables.

Collalba Gris (*Oenanthe oenanthe*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Guadalix de la Sierra, junto al embalse de El Vellón, primeras observaciones de varios ej. el 16.IV (J. de la Puente y L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navalcamero, Fuente Bolilla, 1 ind. el 5.IV (A. García-Parrado).

- Colmenar de Oreja, primeras citas del año el 8.IV y últimas el 13.IX (J. Cano).

- El Pardo, 7 ind. el 21.IV (D. Langlois/GOEP).

- San Martín de Valdeiglesias, reproducción confirmada de 1 pp. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 70 (J.C. Atienza).

Collalba Negra (*Oenanthe leucura*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas recibidas.

Roquero Rojo (*Monticola saxatilis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Bustarviejo, última cita el 1.IX (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

Roquero Solitario (*Monticola solitarius*)

Estatus provincial: s.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, El Piul, confirmada la reproducción en el mes de junio al observarse 1 m. cebar a un pollo. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (F. Martínez Olivás).

Mirlo Capiblanco (*Turdus torquatus*)

Estatus provincial: i, p muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Bustarviejo, Puerto de Canencia, 3 ind. el 11.II y 1 ind. el 7.XII (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

- Colmenar Viejo, cerro de San Pedro, 1 ind. el 15.III (D. Pérez del Molino).

Mirlo Común (*Turdus merula*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Madrid, casco urbano, reproducción temprana: 2 pollos el 16.III (M.J. Martínez).

- Patones, junto al río Jarama, pp. con 2 pollos el 25.V. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 17 (C. Domínguez, O. Pontón y F. Roviralta).

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera. Pasa de reproductor posible a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).

Zorzal Real (*Turdus pilaris*)

Estatus provincial: i, p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Soto del Real, cerro de San Pedro, 1 ind. el 24.II, y 2 grupos de 13 y 6 ej. el 25.II (J.A. Calleja y J. Seoane/SEO-Monticola).

- Bustarviejo, 1 ind. el 11.II (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

Zorzal Común (*Turdus philomelos*)

Estatus provincial: s en la Sierra, l, p.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última cita de invernada/paso prenupcial el 5.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).

Zorzal Alirrojo (*Turdus iliacus*)

Estatus provincial: l, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Zorzal Charlo (*Turdus viscivorus*)

Estatus provincial: S, l.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

Sin citas destacables.

Ruiseñor Bastardo (*Cettia cetti*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Buitrón (*Cisticola juncidis*)

Estatus provincial: s.

Criterio: citas de interés.

Sin citas destacables.

Buscarla Pintoja (*Locustella naevia*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Pardo, fecha tardía de 1 ind. en paso prenupcial el 14.V (D. Langlois/GOEP).

- San Martín de la Vega, Estación de anillamiento de Las Minas, capturas en paso postnupcial: 1 ind. el 6.VIII, 1 el 7.IX, otro el 15.IX y un último el 12.X (J. de la Puente, A. Bermejo y J. Seoane/SEO-Monticola).

- Olmeda de las Fuentes, capturas para anillamiento: 2 ind. el 12.VIII, 1 ind. el 22.VIII, 1 ind. el 18.VIII y 1 ind. el 8.IX (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Buscarla Unicolor (*Locustella luscinioides*)

Estatus provincial: e, p. Al parecer en expansión.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, 1 m. canta el 5.VI (J. de la Puente y J. Seoane/SEO-Monticola).

Carricera Real (*Acrocephalus melanopogon*)

Estatus provincial: A. Con dos únicas citas conocidas: en San Martín de la Vega, en el carrizal de La Estación de Anillamiento de las Minas de 2 ind. capturados para anillamiento el 24.VI y el 25.XI de 1995 (J. de la Puente, J. Seoane y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Carricera Común (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Estatus provincial: p.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura en paso prenupcial de 3 ind. el 5.IV (J. Seoane/SEO-Monticola) y última captura el 4.V (J. de la Puente, J. Seoane y P. Gómez Garre/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, datos de paso postnupcial: primera captura de 3 ind. el 6.VII. Máximo paso postnupcial, 21 individuos capturados el 16.VII. Última captura el 24.VIII (J. de la Puente, A. Bermejo y J. Seoane/SEO-Monticola).



Carricero Común capturado en la Estación de Anillamiento de Las Minas (foto: J. de la Puente/ A. Bermejo).

Carricero Poliglota (*Acrocephalus palustris*)

Estatus provincial: A con dos citas conocidas: el 6.VIII.1989 en la Laguna de San Juan, Chinchón (J.C. del Moral/SEO-Monticola) y otra de un ave recuperada en Mejorada del Campo el 23.VII.1993 y anillada el 22.VIII.1992 en Lieja, Bélgica (Oficina de Anillamiento).

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, captura en paso postnupcial de 1 juv. el 12.X. Cita pendiente de homologación por el Comité de rarezas de SEO/BirdLife (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Carricero Común (*Acrocephalus scirpaceus*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras llegadas: se capturan 2 ind. y cantan varios m. el 5.IV. Última captura de 1 juv. el 10.XI (J. Seoane, J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- El Pardo, 1 ind. el 16.IV (D. Langlois/GOEP).

Carricero Tordal (*Acrocephalus arundinaceus*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, cita de invernada: 1 ind. capturado para anillamiento el 27.I y controlado el 4.II (J. de la Puente, J. Seoane y J.M. Jiménez López/SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primeras llegadas: se capturan 3 ind. y cantan varios m. el 13.IV; última captura de 1 juv. el 5.X (J. de la Puente, A. Bermejo, J. Seoane y B. Molina/SEO-Monticola).

- El Pardo, río Manzanares, 1 ind. el 14.IV (D. Langlois/GOEP).

Zarcero Pálido (*Hippolais pallida*)

Estatus provincial: r, A. Con cita de reproducción en Móstoles en 1982 (Martí *et al.* 1994).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Olmeda de las Fuentes, 1 ind. capturado para anillamiento el 15.VIII (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Zarcero Icterino (*Hippolais icterina*)

Estatus provincial: A con una sola cita del 5.IX.1989 en Olmeda de las Fuentes (*Ardeola* 36[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Zarcero Común (*Hippolais polyglotta*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navalcarnero, Fuente Bolilla, 1 ej. el 12.III (A. García-Parrado)
- Madrid, primeros ind. el 8.IV (J. Cano).
- El Pardo, 2 ind. el 12.IV y cantan varios m. el 27.IV (D. Langlois, A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sofillos).

Curruca Rabilarga (*Sylvia undata*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Boadilla del Monte, reproducción confirmada al localizarse un nido ocupado. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 61 (J.A. Calleja/SEO-Monticola).

Curruca Tomillera (*Sylvia conspicillata*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas recibidas.

Curruca Carrasqueña (*Sylvia cantillans*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, primera observación estival de 1 ind. el 30.III (D. Langlois/GOEP).
- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, observados varios ind. el 14.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 84 (T. Velasco).
- San Martín de Valdeiglesias, reproducción confirmada de varias pp. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 70 (J.C. Atienza).
- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	0	0	5	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0

Curruca Cabecinegra (*Sylvia melanocephala*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	0	1	11	9	0	4	0	5	2	0	0	0	0

Curruca Mirlona (*Sylvia hortensis*)

Estatus provincial: e, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, Esquinazo, 1 ind. el 12.V (D. Langlois/GOEP).
- Villar del Olmo, primera captura para anillamiento en paso postnupcial el 25.VIII y última el 15.IX (J.C. del Moral).

Curruca Zarcera (*Sylvia curruca*)

Estatus provincial: A extremadamente rara con una cita conocida: captura para anillamiento en la Laguna de San Juan el 4.VIII.1985 (*Ardeola* 40[1]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Curruca Zarcera (*Sylvia communis*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura para anillamiento en paso prenupcial: 1 ind. el 27.IV (J. de la Puente y J. Seoane/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura para anillamiento en paso postnupcial: 2 ind. el 30.VII (J. de la Puente, A. Bermejo, J. Seoane, J. Ruiz Esteban y J.A. Calleja/SEO-Monticola).
- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	2	0	2	10	3	6	2	1	0	0	0	0	0

Curruca Mosquitera (*Sylvia borin*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura para anillamiento en paso prenupcial de 1 ave el 13.IV (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola) y última captura en dicho paso el 11.V (J. de la Puente y J. Seoane/SEO-Monticola).
- El Pardo, 1 ind. el 17.IV (D. Langlois/GOEP).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de 2 ind. en paso postnupcial el 24.VIII y última de 1 ind. el 5.X (J. Seoane, B. Molina, P. Gómez Garre y J.A. Calleja/SEO-Monticola).
- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	3	2	20	38	58	49	22	15	5	0	0	0	0

Curruca Capirotada (*Sylvia atricapilla*)

Estatus provincial: E, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas y Reserva Ornitológica Los Albardales, capturas habituales aunque escasas en enero; primera captura de 2 ind. en paso prenupcial el 13.IV y última el 18.V; primera captura en paso postnupcial el 30.IX de 2 ind. (J. de la Puente, A. Bermejo y J. Seoane/SEO-Monticola).
- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, varios ej. el 14.VI (T. Velasco).
- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera, pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).
- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	0	0	0	0	0	2	9	14	47	39	26	14	6

Mosquitero Papialbo (*Phylloscopus bonelli*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, 1 ind. el 16.III (D. Langlois/GOEP).

Mosquitero Silbador (*Phylloscopus sibilatrix*)

Estatus provincial: A. En paso extremadamente raro.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Fresno de Torote, río Torote, 1 ind. cantando el 26.IV (T. Velasco y G. Blanco).

Mosquitero Común (*Phylloscopus collybita*)

Estatus provincial: s, I, P.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última cita de invernada de 1 ind. el 27.IV y primera de invernada el 5.X (J. de la Puente, J. Seoane y A. Bermejo/SEO-Monticola)

Mosquitero Musical (*Phylloscopus trochilus*)

Estatus provincial: P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, primera cita en paso prenupcial de 1 ind. el 29.III y primera de paso postnupcial 3 ind. el 8.VIII (D. Langlois/GOEP).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura para anillamiento en paso prenupcial de 1 ave el 20.IV (A. Bermejo y C. Coletto/SEO-Monticola) y última cita de ave en paso de 1 ej. el 4.V (J. de la Puente, J. Seoane y P. Gómez Garre/SEO-Monticola).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura para anillamiento en paso postnupcial de 3 aves

el 24.VIII y última de 1 ind. el 12.X (J. Seoane, B. Molina, P. Gómez Garre y J.A. Calleja/SEO-Monticola).

- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	9	4	4	5	3	9	1	6	0	0	0	0	0

Reyezuelo Sencillo (*Regulus regulus*)

Estatus provincial: s, l.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, 2 aves el 14.VI en plena época reproductora, las poblaciones reproductoras más cercanas se sitúan en la Sierra de Guadarrama (T. Velasco).

Reyezuelo Listado (*Regulus ignicapillus*)

Estatus provincial: S, l.

Criterio: fechas extremas en zonas de invernada y/o paso y citas de interés.

Sin citas destacables.

Papamoscas Gris (*Muscicapa striata*)

Estatus provincial: e, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navas del Rey, primera observación el 28.IV (J. Peña).

- Velilla de San Antonio, ribera del Jarama, última cita de paso prenupcial: 1 ind. el 18.V (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- El Pardo, río Manzanares, primera observación en paso postnupcial de 2 ind. el 21.VIII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Papamoscas Cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*)

Estatus provincial: E, P.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- San Fernando de Henares, El Gorrion, primera observación del año de 1 m. el 7.III (J.A. López Septiem).

- Valdemorillo, ribera del río Aulencia, primera observación de 3 m. el 14.IV (E. Angulo y A. Polvorinos).

- El Pardo, 1 ind. el 14.IV (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- Rivas-Vaciamadrid, ribera de río Manzanares, primeras observaciones de varios ej. el 16.IV (J. de la Puente/SEO-Monticola).

- Navas del Rey, primera observación el 16.IV (J. Peña).

- El Pardo, primera observación de paso postnupcial de 2 ind. el 30.VII (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- Alcalá de Henares, El Encín, última observación el 13.X (J. Pinilla).

- Madrid, últimos ej. el 19.X (J. Cano).

- Fenología de la migración postnupcial en el Este de Madrid según datos de anillamiento (J.C. del Moral/SEO-Monticola):

Fecha	06/07	20/07	15/08	18/08	24/08	01/09	08/09	14/09	22/09	29/09	06/10	12/10	20/10	27/10	03/11
Nº de capturas	0	0	0	0	8	21	5	19	3	2	0	0	0	0	0

Bigotudo (*Panurus biarmicus*)

Estatus provincial: r, A. Con citas de anillamiento en otoño-invierno de 1986, 87, 88 en Rivas-Vaciamadrid y en 1988 y 1990 en Las Infantas, Aranjuez (Oficina Anillamiento). Reproducción comprobada en Arganda, La Poveda en junio de 1974 (*Ardeola* 20).

Reproducción en Rivas-Vaciamadrid, el Porcal, en los veranos de 1988 y 1989 se observan ad. con cebo (al menos 3 pp.) y se capturan juv. para anillamiento (J. Marchamalo). Reproducción en San Martín de La Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, en 1995 se capturaron 3 pp. distintas en época de reproducción, entre las que se encontraba una h. con placa y a punto de poner el 27.V (J. de la Puente, J. Seoane y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Mito (*Aegithalos caudatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Herrerillo Capuchino (*Parus cristatus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Carbonero Garrapinos (*Parus ater*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villarejo de Salvánés, finca Encomienda Mayor de Castilla, reproducción posible al observarse algún ind. en piores durante la época de reproducción. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 107 (F. Martínez Olivás).

Herrenillo Común (*Parus caeruleus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).

Carbonero Común (*Parus major*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).

Trepador Azul (*Sitta europaea*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Treparriscos (*Tichodroma muraria*)

Estatus provincial: I.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Puebla de la Sierra, 1 ind. en pared del Arroyo de la Puebla el 23.XI (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Agateador Común (*Certhia brachydactyla*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).

Pájaro Moscón (*Remiz pendulinus*)

Estatus provincial: S, I.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, varios ind. el 14.VI (T. Velasco).

- Villamanta, finca Abubilla, 1 pp. cría con éxito en un soto fluvial. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 73 (J.M. Traverso).

Oropéndola (*Oriolus oriolus*)

Estatus provincial: E.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- El Pardo, 1 ind. el 29.III (D. Langlois/GOEP).

- Paredes de Buitrago, primera observación de 1 m. el 22.IV (J.A. Sanz).

- Navas del Rey, primera observación el 25.IV (J. Peña).

Alcaudón Dorsirrojo (*Lanius collurio*)

Estatus provincial: A con dos citas en fecha y hábitat de cría en 1987 y 1995 (*Ardeola* 35[2], 42[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

- Alameda del Valle, 1 ad. el 15.VIII (L.M. Díaz-Regañón/SEO-Monticola).

Alcaudón Real (*Lanius excubitor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturada una h. con placa en la primavera. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).

Alcaudón Común (*Lanius senator*)

Estatus provincial: E, p.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Navalcarnero, Fuente Bolilla, 1 ind. el 31.III (A. García-Parrado).
- Soto del Real, primera observación del año de varios ind. el 3.IV (J. Seoane/SEO-Monticola).
- Navas del Rey, primera observación el 10.IV (J. Peña).
- Colmenar de Oreja, primeros ej. el 21.IV y últimos el 7.IX (J. Cano).
- Manjirón, primera observación de 1 ind. el 22.IV (J.A. Sanz).
- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, primera captura de juv. en dispersión el 24.VII y última el 24.VIII (J. de la Puente, J. Seoane y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Arrendajo (*Garrulus glandarius*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Villarejo de Salvanés, finca Encamienda Mayor de Castilla, 1 ind. en época de cría (F. Martínez Olivas).

Rabilargo (*Cyanopica cyana*)

Estatus provincial: S

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Urraca (*Pica pica*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Chova Piquirroja (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: concentraciones y citas de interés.

- Manzanares el Real, concentración de unos 250 ind. el 4.V (E.L. García de la Morena/SEO-Monticola).

Grajilla (*Corvus monedula*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras máximas en dormideros y citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, gravera de la finca El Porcal, 498 ind. en dormidero el 28.III (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Ciempozuelos, gravera de Las Arriadas, 230 ind. en dormidero el 13.X (J.C. del Moral/SEO-Monticola).
- Rivas-Vaciamadrid, cortados del Manzanares junto a la Casa de los Conejos, 2 ind. parcialmente albinos el 14.X (G. Blanco).

Graja (*Corvus frugilegus*)

Estatus provincial: A.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Corneja Negra (*Corvus corone*)

Estatus provincial: S.

Criterio: cifras importantes y citas de interés.

- El Pardo, 20 ind. juntos en dormidero (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

Cuervo (*Corvus corax*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Perales de Tajuña, nido ocupado en cortados de yesos el 1.V. Pasa de reproductor probable a seguro en la cuadrícula 91 (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Estomino Pinto (*Sturnus vulgaris*)

Estatus provincial: I.

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

Sin citas destacables.

Estornino Negro (*Sturnus unicolor*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrion Común (*Passer domesticus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrion Moruno (*Passer hispaniolensis*)

Estatus provincial: S. En expansión.

Criterio: citas fuera de áreas de reproducción conocidas y citas de interés.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas y cultivos de regadío cercanos, se observan durante el otoño-invierno bandos de varios centenares de ej. (J. de la Puente, J. Seoane y A. Bermejo/SEO-Monticola).

- Villa del Prado, El Alamin, río Alberche, varios ind. el 14.VI. Pasa de no reproductor a reproductor posible en la cuadrícula 84 (T. Velasco).

- Aranjuez, río Tajo en Casa Barciles, 7 aves en soto el 26.XI (T. Velasco).

Gorrion Molinero (*Passer montanus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Gorrion Chillón (*Petronia petronia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

- Cantoblanco, Universidad Autónoma, colonia de varias pp. junto a gorriones comunes y estorninos negros en los sótanos del Edificio de Biología. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 51 (J. de la Puente y Ana Bermejo/SEO-Monticola).

Gorrion Alpino (*Montifringilla nivalis*)

Estatus provincial: A con dos citas: Sierra de Guadarrama cerca del refugio Zabala, en el Circo de Peñalara a 2100 m.s.n.m. 2 individuos el 5.XII.1958 (*Ardeola* 4) y el 17.I.1985 (*Ardeola* 33[1-2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Bengalí Rojo (*Amandava amandava*)

Estatus provincial: S reproductor con poblaciones asilvestradas escapadas de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, carrizal de Estación de Anillamiento de Las Minas, presente todo el año (SEO-Monticola).

- San Martín de la Vega, Reserva Ornitológica Los Albardales, presente todo el año con reproducción comprobada a finales del verano (SEO-Monticola).

- Aranjuez, Las Infantas, unos 100 ind. el 17.IV (J.A. Cuevas).

- Mejorada del campo, Presa del Río, varios ind. en fechas: 13.I, 26.X y 24 XI (M.J. Martínez).

- Aranjuez, carrizal de Las Madres, 6 ad. el 9.XI (M.J. Martínez).

- Rivas-Vaciamadrid, graveras de El Porcal y Los Ángeles, varios ej. en maizal el 28.XII (J.C. del Moral y B. Molina/SEO-Monticola).

Amandava subflava

Estatus provincial: A escapado de cautividad.

Criterio: todas las citas recibidas.

- Primera cita para Madrid: Mejorada del Campo, Las Islillas, 1 ind. capturado para anillamiento con un bando de Bengalí Rojo (J.A. López Septiem y J. Rueda).



Gorrion Moruno capturado en la Estación de Anillamiento de Las Minas. (foto: A Bermejo/ J. de la Puente).

Pico de Coral (*Estrilda astrild*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Una única cita conocida no publicada de una ave capturada para anillamiento en la Estación de Anillamiento de Las Minas el 29.VII.1995 (SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pico de Coral (*Estrilda tragodytes*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Con una única cita: Rivas-Vaciamadrid, 1 ind. el 1.XI.1987 (*Ardeola* 35[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Monjita de Malaca (*Lonchura malacca*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Con dos citas: Arganda, 1 ind. el 16.XI.1973 (*Ardeola* 35[2]) y San Martín de la Vega Estación de Anillamiento de Las Minas, donde se anillaron 3 ind. en el verano de 1995 (J. de la Puente, A. Bermejo y J. Seoane/SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Capuchino cabeciblanco (*Lonchura maja*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Una única cita no publicada de un individuo capturado para anillamiento en la Reserva Ornitológica Los Albarcales en San Martín de la Vega en noviembre de 1992 (SEO-Monticola).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Quelea común (*Quelea quelea*)

Estatus provincial: A escapado de cautividad. Con una cita conocida: Arganda 1 pp. el 15.XI.1973 (*Ardeola* 20).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Pinzón Vulgar (*Fringilla coelebs*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera. Pasa de reproductor posible a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).

Pinzón Real (*Fringilla montifringilla*)

Estatus provincial: I.

Criterio: todas las citas recibidas.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, una h. ad. capturada para anillamiento el 4.I. (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola) y una h. juv. el 25.II (J.C. del Maral y J.M. Jiménez López/SEO-Monticola).

- Valdemorillo, ribera del río Aulencia, cita tardía de 1 ind. el 14.IV (E. Angulo y A. Polvorinos).

- El Pardo, Mingorrubio, 1 ind. el 20.XI (A. Rodríguez Pérez y J.A. Díaz Reyes).

- Aranjuez, río Tajo en finca Barcales, algún ind. en barbecho el 26.XI (T. Velasco).

- Boadilla del Monte, 1 ind. el 24.XII (J.A. Calleja/SEO-Monticola).

Verdecillo (*Serinus serinus*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Verderón Serrano (*Serinus citrinella*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés.

- Puerto de la Morcuera, grupo de unas 200 aves junto al refugio alpino el 3.X (J. de la Puente y A. Bermejo/SEO-Monticola).

Verderón Común (*Carduelis chloris*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

- Rivas-Vaciamadrid, Presa del Rey, capturadas varias h. con placa durante la primavera. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 77 (J. Pinilla y S. Sotillos).

Jilguero (*Carduelis carduelis*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Lúgano (*Carduelis spinus*)

Estatus provincial: I, P. Con reproducción posible en los años 1976 y 77 (*Ardeola* 23).

Criterio: fechas extremas y citas de interés.

- Madrid, Casa de Campo, observado el 15.IX (O. Valero).

Pardillo Común (*Carduelis cannabina*)

Estatus provincial: S, I, P.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Piquituerto Común (*Loxia curvirostra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y citas de interés.

- Belmonte del Tajo, Encamienda, cita de reproducción, 4 m., 2 h. y 1 juv. que es cebado por ad. el 3.II. Pasa de no reproductor a reproductor seguro en la cuadrícula 107 (M.J. Martínez).

- Villarejo de Salvanés, finca La Encamienda, 6 ind. sobrevuelan el pinar el 1.V y 12 ind. comiendo en pinar (al menos 3 juv.) el 12.V (J.C. del Moral/SEO-Monticola).

Camachuelo Común (*Pyrrhula pyrrhula*)

Estatus provincial: I.

Criterio: todas las citas recibidas.

- El Escorial, ribera del río Aulencia, se oye 1 ind. el 27.XII (J. de la Puente/SEO-Monticola).

Picogordo (*Coccothraustes coccothraustes*)

Estatus provincial: S, i, p.

Criterio: sólo citas de interés.

- San Martín de Valdeiglesias, reproducción confirmada de varias pp. Pasa de reproductor probable a reproductor seguro en la cuadrícula 70 (J.C. Añenza).

Paroaria coronata

Estatus provincial: A con una sola cita: en el arroyo Tejada entre Tres Cantos y el Monte del Pardo 1 ej. el 7.VIII.1983 (*Ardeola* 34[2]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Escribano Cerillo (*Emberiza citrinella*)

Estatus provincial: i muy escaso.

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Escribano Soteño (*Emberiza citlus*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Montesino (*Emberiza cia*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

Escribano Hortelano (*Emberiza hortulana*)

Estatus provincial: E.

Criterio: todas las citas fuera de la Sierra y fechas extremas.

Sin citas destacables.

Escribano Pigmeo (*Emberiza pusilla*)

Estatus provincial: A. Con una única cita: en Rivas-Vaciamadrid de 1 ind. capturado para anillamiento el 25.X.1989 (*Ardeola* 38[1]).

Criterio: todas las citas recibidas.

Sin citas recibidas.

Escribano Palustre (*Emberiza schoeniclus*)

Estatus provincial: I, P. Estival occidental.

Criterio: fechas extremas y citas estivales.

- San Martín de la Vega, Estación de Anillamiento de Las Minas, última cita de invernada el 23.III (J.C. del Moral y J.M. Jiménez López/SEO-Monticola).

- Aranjuez, Castillejo, primera observación de otoño el 6.X (J. Pinilla).

Triguero (*Miliaria calandra*)

Estatus provincial: S.

Criterio: sólo citas de interés.

Sin citas destacables.

BIBLIOGRAFÍA

Para la realización de la lista se ha empleado la siguiente bibliografía:

- ✍ Cobo Anula, J.; Martínez Olivas, F. y Ortúñez, E. 1991. *Inventario y propuestas de conservación de los carrizales madrileños*. Agencia de Medio Ambiente. Madrid.
- ✍ De Juana, E. 1995. *Lista de las aves de la Península Ibérica*. SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ García y Gans, F.J. 1994. Criterios a seguir y problemática en la identificación de las tórtolas urbanas. En *Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana 1992*. Valencia.
- ✍ Madge, S. y Burn, H. 1992. *Wildfowl. An Identification guide to the ducks, geese and swans of the world*. Ed. Helm. Londres.
- ✍ Martí, R.; Díaz, M.; Gómez-Manzaneque, A. y Sánchez, A. (coord.). 1994. *Atlas de las aves nidificantes de la Comunidad de Madrid*. AMA, SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ Palomares, L.; Marchamalo, J. y Sainz, J. 1996. Observaciones invernales de Gaviota Cabecinegra *Larus melanocephalus* en el interior peninsular (Madrid). Inviernos 1994-95/1995-96. *Bol. GLAM*, 22: 7-8.
- ✍ Voous, K. H. 1977. *List of Recent Holarctic Bird Species*. Ibis suppl. Londres.