

CENSOS INVIERNALES DE BUITRE LEONADO (*Gyps fulvus*) EN LA COMUNIDAD DE MADRID. AÑOS 2000 Y 2001

José María
TRAVERSO (coord.)

C/ Jardines, 18
28610 Villamanta (Madrid)
chema.traverso@terra.es

INTRODUCCIÓN

El Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) es una especie típicamente rupícola y colonial, que tiene una población reproductora muy importante en España, superando actualmente las 17.000 parejas (Del Moral *et al.* 1999). La población madrileña ha experimentado un espectacular aumento en las dos últimas décadas, así como el resto de la población española (Del Moral y Martí 2001), pasando de las 11 parejas en 1979 a las 177 parejas reproductoras en Madrid en 1999 (Traverso 2000).

RESUMEN

Durante el atardecer y el amanecer de los días 24 y 25 de noviembre del 2000 y los días 25 y 26 de noviembre del 2001, se realizaron respectivamente el primer y segundo censo invernal del Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. En el año 2000 se controlaron 23 dormideros, de los cuales estuvieron en activo 18 con un total 640 buitres leonados. En el año 2001 se censaron 27 dormideros, de los que 17 dieron censo positivo, contabilizándose 653 ejemplares.

A pesar de ser una de las rapaces mejor conocidas en Madrid, existe una gran laguna en lo referente a la situación de la población invernante. En el presente trabajo se aportan los resultados del primer y segundo censo invernal de Buitre Leonado realizados en la Comunidad de Madrid.

METODOLOGÍA

El área de estudio abarcó todo el territorio de la Comunidad de Madrid, aunque para conseguir una mayor coherencia en el censo y por su interrelación con los dormideros de Madrid, se ha incluido una zona limítrofe de la provincia de Ávila que pertenece al término municipal de Cebreros (zona del río Cofio).

Se prospectaron todos los lugares de nidificación nuevos y antiguos, así como los dormideros conocidos y lugares apro-




piados para dicha especie, antes de la realización del censo coordinado, para determinar su funcionalidad actual.

Para la determinación del número de ejemplares invernantes se realizó un censo simultáneo de todos los dormideros los días 24 y 25 de noviembre del 2000 y los días 25 y 26 de noviembre del 2001. El horario de censo fue el primer día de cada censo desde las 16:30 h hasta el anochecer, y a la mañana siguiente desde el amanecer hasta acabar el recuento de los ejemplares. De esta manera se evitaba en la medida de lo posible la duplicidad de datos derivada del intercambio de ejemplares entre dormideros.

Para facilitar la realización del censo y la presentación de los resultados, se dividió el área de estudio en las siguientes

zonas, que coinciden con unidades geográficas: Somosierra, valle del Lozoya, La Cabrera, valle de Bustarviejo, La Pedriza-Morcuera, Valdemaqueda, Almenara, río Cofio, Las Cabreras y embalse de Picadas (figura 1).

Todo lugar donde se localizó al menos un Buitre Leonado se consideró como dormitorio, y como dormitorios diferentes se tuvieron en cuenta aquellos separados más de un kilómetro entre ellos.



- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1. Somosierra | 6. Valdemaqueda |
| 2. Valle del Lozoya | 7. Río Cofio |
| 3. La Cabrera | 8. Las Cabreras |
| 4. Valle de Bustarviejo | 9. Embalse de Picadas |
| 5. La Pedriza-Morcuera | 10. La Almenara |

Figura 1. Localización de las zonas censadas con dormitorios activos de Buitre Leonado en los años 2000 y 2001 en la Comunidad de Madrid.

RESULTADOS

En el año 2000 se controlaron 23 dormideros, de los cuales estuvieron en activo 18 con un total 640 buitres leonados. En el año 2001 se censaron 27 dormideros, de los que 17 dieron censo positivo, contabilizándose 653 ejemplares.

Los resultados de los dos censos, por zonas de prospección, se presentan en la tabla I. El incremento en el número de individuos del censo del 2001, con respecto al de 2000, se debe a una mejor cobertura del territorio, en especial de la zona de La Pedriza (Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares).

El dormidero de Las Cabrerías (San Martín de Valdeiglesias) aporta las cifras más altas en los dos censos (28% en el 2000 y el 36% en el 2001, del total de invernantes). El de La

Zona	Pueblos incluidos	2000		2001	
		N.º dormideros	N.º aves	N.º dormideros	N.º aves
Somosierra	Paredes de Buitrago				
	Puebla de la Sierra	2	10	0	0
Valle del Lozoya	Pinilla del Valle				
	Alameda del Valle	2	4	1	2
La Cabrera	La Cabrera	2	75	2	48
Valle de Bustarviejo	Bustarviejo	3	21	3	7
La Pedriza	El Boalo				
	Manzanares el Real				
	Soto del Real	7	143	13	173
Valdemaqueda	Valdemaqueda	2	79	2	77
Almenara	Robledo de Chavela	-	-	1	28
Río Cofio	Valdemaqueda				
	Robledo de Chavela				
	Cebreros (Ávila)	3	127	2	73
Las Cabrerías	San Martín de Valdeiglesias	2	181	2	238
Embalse de Picadas	Pelayos de la Presa	-	-	1	7
Total		23	640	27	653

Tabla 1. Resultado del primer y segundo censo de Buitre Leonado en dormideros en la Comunidad de Madrid, realizados en noviembre de 2000 y 2001, respectivamente. Se indican las localidades que se prospectaron ordenadas de norte a sur.

Pedriza (Manzanares el Real) es el segundo en importancia (22% en el 2000 y el 26% en el 2001). Más de la mitad de la población invernante de Buitre Leonado se localiza en la esquina suroeste de la Comunidad (60% en el 2000 y 65% en el 2001), seguramente por la mayor disponibilidad de alimento en esta zona.

Como aspecto curioso cabe señalar que los dos dormideros de la zona de Valdemaqueda son los únicos que están en su totalidad en un bosque de pino resinero (*Pinus pinaster*). Esta zona también es utilizada por el Buitre Leonado para su nidificación, siendo la única colonia de nidificación en árbol que se halla en la Comunidad de Madrid actualmente (Traverso 1998).

EQUIPO DE TRABAJO

El censo ha sido realizado por: J. Alonso, J. C. Álvarez, A. Álvarez, G. Álvarez, J. Á. de Ayala, L. J. Bernárdez, F. J. Cabezas, E. Cabrero, J. A. Calleja, D. Díez, J. Díez, E. Díez-Madroño, M. Díez-Madroño, E. Escudero, I. Esteban, M. P. Fernández, J. Fernández, J. A. Fimia, I. Flores, C. Galán, E. L. García de la Morena, S. García, D. Goya, I. Juncal, R. Lacruz, B. Lacruz, R. (jr.) Lacruz, J. A. León, J. A. López Septiem, M. Magdalena, D. Martínez, F. Martínez, F. Mesquida, L. Mesonero, A. Mirat, C. Molina, F. Moreno, R. Moreno-Opo, A. Pérez, C. Ponce, G. Pulido, A. Pozuelo, J. A. Rodríguez, A. Rodríguez, F. Roviralta, F. Samino, J. Sánchez-Guijaldo, J. Tello, E. Teran, P. Torres y J. M. Traverso.

AGRADECIMIENTOS

A la Asociación para la Educación Ambiental y Defensa de la Naturaleza (RETAMA), por la ayuda económica para poder elaborar una camiseta conmemorativa del II Censo Invernal de Buitre Leonado en la Comunidad de Madrid y correspondencia. Los comentarios de Javier Seoane y Jesús Pinilla mejoraron el manuscrito original. La realización del primer censo invernal de Buitre Leonado fue

motivada por la elaboración del *Atlas de Aves Invernantes de Madrid* (Del Moral *et al.* 2002), realizado por el Grupo Ornitológico SEO-Monticola.



BIBLIOGRAFÍA

- ✍ Del Moral, J. C.; Martínez, F.; Doval, G. y Martí, R. 1999. III Censo Nacional de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la península Ibérica. *La Garcilla*, 106: 24-28.
- ✍ Del Moral, J. C. y Martí, R. (ed.) 2001. *El Buitre Leonado en la península Ibérica*. Monografía n°7. SEO/BirdLife. Madrid.
- ✍ Del Moral, J. C.; Molina, B.; De la Puente, J. y Pérez-Tris, J. (ed.) 2002. *Atlas de las Aves Invernantes en Madrid. 1999-2001*. SEO-Monticola y Comunidad de Madrid. Madrid.
- ✍ Traverso, J. M. 1998. Eurasian Griffons *Gyps fulvus* nesting on pine trees. *Vulture News*, 39: 25-26.
- ✍ Traverso, J. M. (coord.) 2000. Censo de la población reproductora de Buitre Leonado (*Gyps fulvus*) en la Comunidad de Madrid. 1999. En: Bermejo, A.; De la Puente, J. y Seoane, J. (ed.). *Anuario Ornitológico de Madrid 1999*: 156-159. SEO-Monticola. Madrid.